

STANDARDE
medicale de diagnostic și tratament
în ginecologie

CIM Unitatea Nozologică	Etapa acordării asistenței medicale	Denumirea investigațiilor diagnostice	Tratamentul	Doza	Numărul comprimate, fiole, flacoane, prize	Durata tratamentului
N75.0 Chist a glandei Bartholin	spitalicesc	Examen ginecologic	Enuclearea chistului			1 zi
		Analiza generală a sîngelui				
		Grupa sanguină, Rh	Tratament medical postoperator			
		Analiza generală a urinei	Sol. Lincomycinum 30%-2ml	1.0x2 ori i/m	2 fiole	
		Bacteriologia vaginală	Sup. Diclofenacum 100mg	100mg x 1 /zi	2 supp	
		RW	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1ml (Combinăție)	1ml x2 ori i/m.	2 fiole	
		ECG	Comp. Metronidazolium 0,5	0.5 x 3 ori	3 comp	
			Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	3 comp	
			Cp. Fluconazol 150 mg	150 mg	1 cp	
			Tifon	metri	1 m	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% -50ml	50 ml	100 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	100ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	10 ml	
			Catgut		2	
			Măști	buc.	1 buc.	
	Mănuși	perechi	3p			
N75.1 Abces al glandei Bartholin	spitalicesc	Examen ginecologic	Deschiderea și drenarea abcesului			1 zi
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator:			

		Grupa sanguină, Rh	Sol. Ampicilina 1,0 sau Cefazolina 1.0	1,0x3 i/m	3 f	
		Analiza generală a	Cp Fluconazol 150 mg	150 mg	1 cp	
		RW	Sol. Omnopon (Combi-nație) 2%-1ml	1ml x2 ori	2 fiole	
		Bacteriologia vaginală	Comp. Metronidazolium 0,5	0.5 x 3 ori	3 cp	
		Bacterioscopia conținutului abcesului	Ung. Levomicoli (Chloramphenicolum + Methyluracilum) 5mg	5mg	1 tub	
			Mănuși	perechi	3	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	50 ml	100ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	100ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	10ml	
			Măști	buc.	3 G121buc.	
			Tifon	metri	1m	
N.90 Tumori benigne ale perineului, vaginului	spitalicesc	Analiza generală a sîngelui	Înlăturarea formațiunii tumorale			3-5 zile
		Grupa sanguină, Rh	Tratamentul medicamentos postoperator :			
		Analiza generală a urinei	Comp. Metronidazolium 0,5	0,5x3 ori	75 comp	
		RW	Comp. Fluconasolum 100mg	100mg	5 comp.	
		Bacteriologia vaginală				
		EKG	Sol. Omnopon (Combi-nație) 2%-1ml	1ml x2 ori	4 fiole	
			Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	10 comp.	
			Mănuși	perechi	9 perechi	
			Catgut		4 fiole	

			Tifon	metri	3 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	50 ml	150 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	150 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu 3%-10ml	10 ml	30 ml	
			Măști	bucăți	3 buc.	
Chist a ductului Hartner	spitalicesc	Examen ginecologic	Enuclearea chistului			1 zi
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator :			1 zi
		Grupa sanguină, Rh	Cefazolinum 1,0	1.0x3 ori i/m	3fl	
		Analiza generală a RW	Cp. Fluconazolium 150mg	150 mg	1 cp	
		Bacteriologia vaginală	Sup. Diclofenacum 100mg	100mg x 1 /zi	2 supp	
		EKG	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1 ml	1ml x2 ori i/m.	2 fl	
		Protronbin,fibrinogen	Comp. Metronidazolium 0,5	0.5 x 3 ori	3 cp	
		Coagulograma	Vikril		1 fiolă	
			Mănuși	perechi	3p	
			Tifon	metri	3 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% -50ml	50 ml	100ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	100 ml	
			Catgut		2 fiole	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	10 ml	
			Măști	buc.	3 buc.	
Ruptura veche a mușchilor	spitalicesc	Examen ginecologic	Colporafie posterioara cu levatoroplastie			1-3 zile

perineali		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator:			
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 1	1fl	
		Analiza generală a urinei	Sol .Omnopon (Combinăție) 2%-1ml	1ml i/m. x 2	2 fiole	
		RW	Sup. Diclofenacum 100mg	100mg x 1 /zi	3 supp	
		Bacterioscopia	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	3 cm	
		Bacteriologia vaginală	Cefazolinum 1,0	1.0x3 ori i/m	3-9fl	
		Protrombina	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		Fibrinogenul	Ulei de ricin *	30	1 fl.	
		EKG	Mănuși	perechi	9 perechi	
			Tifon	metri	10 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	50 ml	150ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	100 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	10 ml	
			catgut	fiole	2 fiole	
			vicril	fiole	4 fiole	
			Măști	buc.	3buc.	
	Ruptura perineului gr. III	spitalicesc	Examen ginecologic	°Colpoperineoplastie cu sfincterolevatoroplastie		
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml x 2	2 fl	
		Analiza generală a urinei	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	2 fl	
		RW	Nadroparini calcium 0,3	1.0 i/m. x 2	2 fiole	
		Bacteriologia			3 doze	
		Protrombina	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1ml	1ml x2 ori i/m.	2 fiole	
	Fibrinogenul	Cefazolinum 1,0	1.0 x 3 i/m	3 fl.		

		ECG				
			Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
			Ulei de ricin *	30	1 fl.	
			Mănuși	perechi	3:00 PM	
			Tifon	metri	3m	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	100 ml	100 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	100 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	10 ml	
			Vicril	fiole	4 fiole	
			Catgut	fiole	3 fiole	
			Măști	buc.	3 buc.	
Strictură posttraumatică a vaginului		Examen ginecologic	Plastia vaginului			1-3zi
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Grupa sanguină, Rh	Cefazolinum 1,0	1.0x3 ori i/m	3 fl.	
		Bacteriologia	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1ml	1ml x2 ori i/m.	2 fiole	
		RW	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		Analiza generală a	Catgut		2 fiole	
		ECG	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	3 cp	
			Mănuși	perechi	3perechi	
			Tifon	6 metri	6metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3%- 50 ml	100 ml	100ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	50ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	10 ml	
			Măști	buc.	3 buc.	
N82.3 Fistula recto-vaginală	spitalicesc	Examen ginecologic	°Suturarea fistulei recto-vaginale			5 zile

		Rectoromanoscopie	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Analiza generală a	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Analiza generală a urinei				
		RW				
		Bacteriologia vaginală	Sol. Omnopon (Combinatie) 2%-1ml (Combinatie)	1ml x2 ori i/m.	6 fiole	
		Protrombina	Comp. Metronidazolom 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		Fibrinogenul	Cefazolinum 1,0	1.0x3 ori i/m	15 fl.	
		EKG	Comp. Fluconazolom 0,15	150 mg	1 comp.	
			Dexon * nr.1, 2, 3	fiole	2 fiole	
			Ulei de ricin *	30	1 fl.	
			Mănuși	3 perechi	9 perechi	
			Tifon	metri	6 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	100 ml	250 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	250 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	50 ml	50 ml	
			Măști	buc.	3 buc.	
N82.0 Fistula vezico-vaginală	spitalicesc	Examen ginecologic	°Laparotomie, suturarea fistulei vezico-vaginale			6 zile
		Cistoscopie	Tratamentul medicamentos			
		Fistulografie	Sol. Natrii chloridum 0.9 % - 500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Analiza generală a	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Glucosum 10 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Analiza generală a urinei				
		RW	Sol. Morphinum 1% - 1ml	1ml i/m. x 2	6 fiole	

		Bacteriologia vaginală				
		ECG				
		Protrombina	Sol. Natrii chloridum 4% -40ml	40 ml x 2	160 ml	
		Fibrinogenul	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m.	3 fl.	
			Sol.Metronidazolium 0,5%-100ml	100 ml x 2 i/v	4 fl.	
			Ulei de ricin *	30 ml	1 fl.	
			Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3	15 comp.	
			Comp. Metronidazolium 0,5	0,5 x 3	15 comp.	
			Comp. Fluconazolium 0,15	150 mg	1 comp.	
			Mănuși	perechi	9 perechi	
			Tifon	1 metru	6 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	50 ml	300 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	20 ml	120 ml	
			Catgut	fiole	4 fiole	

			Vicril	fiole	4 fiole	
			Dexon	fiole	3 fiole	
			Sol.Permanganat de potasiu 3%-20ml	20 ml	120 ml	
			Măști	buc.	3buc.	
T19. Corp străin în vagin	spitalicesc	Examen ginecologic	°Înlăturarea corpului străin			1 zi
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Grupa sanguină, Rh				
		RW				
		Bacteriologia vaginală	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1ml	1.0 ml i/m	2 fiole	
		ECG	Comp. Metronidazolom 0,5	0.5 x 3 ori	3cp	
			Mănuși	perechi	3 perechi	
			Tifon	metri	1m	
			Sol.Hydrogenii peroxydum 3% -50 ml	50 ml	100 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	250 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	10 ml	
			Măști	buc.	3buc.	
T07.Trauma organelor genitale	spitalicesc	Examen ginecologic	°Intervenție chirurgicală			1-3zile
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Morphinum 1% - 1ml	2ml i/m x 2 ori	4 fiole	
		Analiza generală a urinei	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1ml	1ml x 3 ori i/m.	6 fiole	
		RW	Sol. Natrii chloridum 0,9% -500ml	500ml	1fl.	

		Bacteriologia vaginală	Sol. Glucosu 5% -500ml	500ml	1fl.	
		Coagulograma	Comp. Metronidazolum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		ECG	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
			Cefazolinum 1,0	1.0x3 ori i/m.	15 fl.	
			Catgut		1 fiolă	
			Mănuși	perechi	8 perechi	
			Tifon	3 metri	10 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	50 ml	250 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	250 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	50 ml	
			Măști	buc.	3buc.	
N89.7	spitalicesc	Examen ginecologic	Himnectomie			3 zile
Hematocolpos		Examen USG + org. sistemului urinar	Sol. Omnopon (Combinatie) 2%-1ml	1,0 x 2i/m	4 fiole	
,hematometră,		Analiza generală a	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	9 comp.	
		Grupa sanguină, Rh	Cefazolinum 1,0	1.0x2 ori i/m	6 fl.	
		Analiza generală a urinei	Tifon	3 metri	5 metri	

		RW	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	500 ml	1000 ml	
		Bacteriologia vaginală	Povidoni iodidum 50ml	50 ml	150 ml	
		EKG	Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	30 ml	
			Catgut	fiole	2 fiole	
			Măști	buc.	3 buc.	
			Mănuși	perechi	6 perechi	
N89.5 Atrezia vaginului	spitalicesc	Examen ginecologic	Plastia vaginului			3 zile
		Examen USG + org. sistemului urinar	Cefazolinum 1,0	1.0x2 ori i/m	6 fl.	
		Analiza generală a sîngelui	Sol Promedol (Trimeperidinum) 2%-1,0	1,0 x 2 i/m	4 fiole	
		Grupa sanguină, Rh	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	9 comp.	
		Analiza generală a urinei	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
		RW	Tifon	3 metri	5 metri	
		Bacteriologia vaginală	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	500 ml	1000 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	150 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	30 ml	
			Măști	buc.	3 buc.	
Q52.1 Sept vaginal. Vagin dublu	spitalicesc	Examen ginecologic	Înlăturarea septului vaginal			3 zile
		Examen USG + org. sistemului urinar	Cefazolinum 1,0	1.0x2 ori i/m	6 fl.	
		Analiza generală a	Sol Promedol (Trimeperidinum) 2%-1,0	1,0 x 2 i/m	4 fiole	
		Grupa sanguină, Rh	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	9 comp.	

		Analiza generală a urinei	Mănuși	perechi	6 perechi	
		RW	Tifon	3 metri	5 metri	
		Bacteriologia vaginală	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	50 ml	100,0 ml	
		ECG	Povidoni iodidum 50ml	50 ml	150 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	30ml	
			Măști	buc.	3 buc.	
Ruptură veche a	spitalicesc	Examen ginecologic	°Operația Emmet			3- 5 zile
		Studiu histologic	°Operația Sturmdorf			
		Analiza generală a sîngelui	Sol. Lincomycinum 30%-2ml	2mlx 2i/m	6 fiole	
		Analiza generală a urinei	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1ml	1ml x 2 i/m	4 fiole	
		Biochimia sîngelui	Catgut		2 fiole	
		RW	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	9 comp.	
		Bacteriologia vaginală	Mănuși	perechi	6 perechi	
		ECG	Tifon	3 metri	5 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	50 ml	150 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	150 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	30 ml	
			Dexoni	fiole	2 fiole	
			Catgut N3	fiole	2 fiole	
			Măști	buc.	3 buc.	
N80.8 Endometrioza colului uterin	spitalicesc	Examen ginecologic				
		Analiza generală a sîngelui	°Operația Emmet			3 zile

		Grupa sanguină, Rh	°Operația Sturmdorf			5 zile
		RW				
		Bacteriologia vaginală	Sol. Lincomycinum 30%-2ml	2mlx 2 i/m	6 fiole	
		Analiza generală a urinei	Sup. Diclofenacum 100mg	1 sup	3 sup	
		Studiu histologic al colului uterin	Mănuși	perechi	9 perechi	

			Tifon	3 metri	10 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	50 ml	150 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	50 ml	150 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	30 ml	
			Măști	buc.	3 buc.	
			Dexon N3	fiole	4 fiole	
N 86 Erozie și ectropion	spitalicesc	Examen ginecologic	°DTC			1 zi
		Colposcopie	°DT excizia colului uterin			
		Citologie de pe col	Comp. Doxycyclinum 100mg	1 comp x 2	2 comp	
		Studiu histologic	Mănuși	3 perechi		
			Tifon	1 metru		
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml		
			Povidoni iodidum 50ml	20 ml		
			Sol. Permanganat de potasiu 3%-10ml	10 ml		
			Măști	3 buc.		

N 84.1 Polip a canalului cervical	spitalicesc	Analiza generala a sîngelui	Chiuretaj fractionat diagnostic			1 zi
		Analiza generala a	Comp. Doxycyclinum 100mg	1 comp x 2	2 comp	
		Bacteriologia vaginală				
		RW	Mănuși	3 perechi		
		Colposcopie	Tifon	1 metru		
		Citologie de pe col	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml		
			Povidoni iodidum 50ml	20 ml		
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml		
			Măști	3 buc.		
Miom a colului uterin	spitalicesc	Examen ginecologic	°Enuclearea miomului pe picioruș			3-7 zile
		Analiza generală a sîngelui	°Extirparea uterului			
		Grupa sanguină, Rh				
		Bacteriologia vaginală				
		RW				
		Analiza generală a urinei	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Colposcopie	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500 ml i/v x	6 fl.	
		Citologie de pe col	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	

		Studiu histologic	Sol. Glucosum 10 % -500ml	500ml i/v x 2	2 fl.	
		Glicemia	Nadroparini calcium 0,3	0,3ml s/c	5 fiole	
		Proteina generală				
		Bilirubina tot/directa	Sol. Omnopon (Combinatie) 2%-1ml	1ml i/m. x 3 ori	6 fiole	
		Coagulograma	Sol. Kalii chloridum 4% -40 ml	40 ml x 2	160 ml	
		ECG	Ceftriaxonum 1,0	1.0 x 3i/v,	10 fl.	
			Sol. Metronidazolium 0,5%-100ml	100 ml x 2 i/v	2 fl.	
			Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
			Comp. Fluconazolium 0,15	150 mg	1 comp.	
			Sol. Prozerină (Neostigmini methylysulphas) 0,5%-1ml		1 fiol	
			Mănuși	3 perechi	9 perechi	
			Tifon	1 metru	7 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	60 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	20 ml	140 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	30 ml	
			Măști	3 buc.	9 buc.	
D 25.9 Miom uterin	spitalicesc	Examen ginecologic	°Laparotomie [histerectomie subtotală, totală, cu sau fără anexe; miomectomie, miometrectomie] (volumul operației – în dependență de vârsta pacientei – dorința păstrării funcției reproductive, localizarea nodulilor miomatoși, rezultatul histologic)			7 zile

		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	6 fl.	
		RW	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	

		Bacteriologia vaginală	Sol. Glucosum 10 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Analiza generală a urinei	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1ml	2ml i/m. x 3 ori	4 fiole	
		Examen USG	Sol. Kalii chloridum 4% -40 ml	40 ml x 2	160 ml	
		Citologie de pe col	Nadroparini calcium 0,3	0.3 s.c	5 fiole	
		Histerosalpingografie (suspecție la nod submucos)	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m x 3 ori	9 fl.	
		Studiu histologic (dupa operatie)	Sol. Metronidazolium 0,5%-100ml	100 ml x 2 i/v	4 fl.	
		Glucosa sîngelui	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		Proteina generală	Comp. Fluconazolium 0,15	150 mg	1 comp.	
		Bilirubina tot/directă	Mănuși	perechi	9 perechi	
		Coagulograma	Tifon	1 metru	10 metri	
		EKG	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	140 ml	
			Povidoni iodidum 20ml	20 ml	140 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	70 ml	
			Măști	buc.	3 buc.	
N 80.0	medicina primară	Examen ginecologic	Depo-provera 150 mg	1 luna	6-9 luni	
Adenomioză		Analiza generala a sîngelui	COC (Janine)		neintrerupt	
		Analiza generala a urinei	Sup. Diclofenacum 100mg	1 sup	la necesitate	
		Bacteriologia vaginală				

		RW				
Adenomioza gradul III + metroragie	spitalicesc	Examen ginecologic	Laparatomic(Histerectomie subtotală sau totală)			5-7 zile
		Analiza generala sîngelui	Tratamentul medicamentos			10 zile
		Analiza generala a urinei	Ceftriaxonum 1,0	1.0 x 2 ori i/v (i/m.)	10 fl.	
		Grupa,Rh	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		RW	Sol. Omnopon (Combinatie) 2%-1ml	1ml i/m x 2 ori	4 fiole	
		Bacteriologia vaginală	Nadroparini calcium 0,3	0,3 s/c	5 fiole	
		Rezultatele raclajului fracționat	Comp. Metronidazolum 0,5	0,5 x 3ori	15 comp.	
		Citologia de pe col	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 2 ori	10 comp.	
		EKG	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina generala	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Bilirubina tot/directa	Sol. Glucosum 10%- 500ml	500ml i/v x 2	4fl	
		Coagulograma	Sol. Natrii chloridum 4% -40ml	40 ml x 2	160 ml	
			Comp. Sorbifer (Ferrosi sulfas + Acidum	1 comp x 2	3-6 luni	
			Mănuși	1 metru	7 metri	
			Tifon	20 ml	140 ml	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	20 ml	
			Povidoni iodidum 20ml	10 ml	10 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml			

N71 Inflamații cronice a	medicina primară	Examen ginecologic	Tratament medicamentos:			
		Analiza generală a sîngelui	Antibioticoterapie în depen.de antibioticograma			
		Analiza generală a urinei	COC (Regulon) (Desogestrelum + Ethinylestradiolum)			
		Bacteriologia vaginală				

		RW				
		Examen USG				
		Investigații la TORCH infecții				
Corp străin în uter (sterilet, etc)	m. primara spitalicesc		Extragerea DIU			1 zi
		Examen ginecologic	Laparatomie (în caz de complicație cu peritonită sau suspiciu la perforație)			7 zile
		Examen USG				
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Analiza generală a urinei	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Bacteriologia vaginală	Sol. Glucosum 10 %- 500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		RW				
		ECG	Sol. Kalii chloridum 4% -40ml	40 ml x 2	160 ml	
		Coagulograma				
			Nadroparini calcium 0,3	0,3 s/c	5 fl	
			Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m.	7 fl	
			Sol. Metronidazolom 0,5%-100ml	100 ml x 2	2 fl.	
			Ulei de ricin *30ml	30 ml	1 fl.	
			Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
			Comp. Metronidazolom 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
			Comp. Fluconazolom 0,15	150 mg	1 comp.	

			Mănuși	perechi	9 perechi	
			Tifon	1 metru	7 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	140 ml	
			Povidoni iodidum 20ml	20 ml	140 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu 3%-10ml	10 ml	70 ml	
			Măști	3 buc.	3 buc.	
N 83 Tumori benigne ale ovarului (chist	spitalicesc	Examen ginecologic	Anestezie generală sau regională Laparoscopie(enucleierea chistului, ovariectomie, anexectomie)			3-5 zile
		Examen USG	°Laparotomie (enuclearea chistului; ovariectomie; anexectomie; histerectomie subtotală cu anexe. rezectia omentului)			
		Studiu histologic	(volumul operației în dependență de vârsta pacientei, examenul macroscopic a tumorii)			
		Analiza generală a	Tratamentul medicamentos			
		Glucoza sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 %-500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina totală	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Bilirubina tot/directă	Sol. Glucosum 10 %-500ml	500ml i/v x 2	2 fl.	
		Grupa sanguină, Rh	Sol Promedol (Trimeperidinum) 2%- 1,0	1ml i/m. x 2	4 fiole	
		Bacteriologia vaginală				
		RW	Sol. Kalii chloridum 4%-40ml	40 ml x 2	160 ml	
		Coagulograma				
		CA - 125	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	3 fl.	
		ECG	Sol. Metronidazolom 0,5%-100ml	100 ml x 2 i/v	2 fl.	
		Analiza generală a urinei	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
			Comp. Fluconazolom 0,15	150 mg	1 comp.	

			Mănuși	3 perechi	9 perechi	
			Tifon	1 metru	7 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	140 ml	
			Povidoni iodidum 20ml	20 ml	140 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	70 ml	
			Măști	3 buc.	3 buc.	
N.83.2 Chistom ovarian	spitalicesc	Analiza generală a sîngelui	Tratament chirurgical:			5 zile
		Analiza generală a urinei	Chist sau anexectomie laparoscopică sau prin laparotomie			
		Bacterioscopia vaginală				
		RW	Anestezie generală, regională			
		Grupa sanguina, KPI-factor	Tratament medicamentos:			7 zile
		Histologie	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	5 fl	
		Examen USG	Sol.Natrii chloridum 0,9%-500ml	500ml x2orilzi	6 fl	
			Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
			Sol Promedol (Trimeperidinum) 2%- 1,0	1ml i/m. x 2 ori	4 fiole	
			Sol. Metronidazolum 0,5%-100ml	100 ml x 2	2 fl.	
			Truse perfuzii		3	
			Seringi 5 ml		20	
			Seringi 2ml		15	
			Iod 5%		50 ml	
			Tifon		5m	
N70.0Abces al trompei și ovarelor	spitalicesc	Examen ginecologic	Tratament chirurgical laparatomic sau laparoscopic : anexectomie	1,0x3 i/v,i/m		7-14 zile

		Analiza generală a sîngelui	Cefazolina 1,0 sau Sol. Lincomicina 30%-2,0	1,0 x 3 i/m sau 2,0 x2 ori i/m		
		Analiza generală a	Sol. Metronidazolum 100ml-0,5%	2 flx3		
			Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0,5x2		
		USG	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		RW				
		Flora c/c și antibioticograma				
			Sup. Ketoprofenum 0,1	1 sup x în zi		
				30,0x10		
		Anesteziologul	Tampoane vaginale: Sol. Dimethylsulfoxidum 30%-100ml	10x10,0		
		Laparoscopie diagnostică	Mănuși	3 perechi		
		Bilirubin ALT, AST	Tifon	metri		
		Proteina C reactivă	Sol. Natrii chloridum 0,9%- 500ml	ori		
			Sol. Glucosum- 5% -500ml	ori		
			Sol. Glucosum 10%- 500ml	400i/vx2 ori		
N70.1 Salpingită cronică și ooforită cu infertilitate	medicină primară	Examen ginecologic				
		Analiza generală a sîngelui	Sol. Lincomycinum 30%-1ml	2,0x3 i/m		

		Bacteriologia vaginala	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		RW				
		Flora c/c și antibioticograma	Sup. Ketoprofenum 0,1 – rectal	1 supx1zi		
	spitaliceasc	sîngelui	Laporoscopia diagnostică - curativă			1 zi
		Analiza generală a urinei	Sanarea vaginului:			
		Bacteriologia vaginală	Sol. Clorofilpt (Extractum folia Eucalypti) 1%-100ml spir.	30ml		
		RW	Supp vaginale cu Metronidazolum + Miconazolum nr 7	1 supx1zi		
		USG	Sol. Gentamicinum 4%-2ml	dren		
		Flora c/c și antibioticograma	Sol. Natrii chloridum 0,9%- 500ml	500 ml x1		
		Histerosalpingografie				
Hydrosalpinx	primară	Hemograma	Comp.Nistatină 0,5	0,5x4		7 zile
		Analiza generală a urinei	Cp Ibuprofen 400 mg			
		flora c/c și	Sol. Lincomycinum 30%-1ml	2mlx2 i/m		
		RW				
	spitaliceasca	Analiza generală a sîngelui	Laparoscopia diagnostică sau chirurgicală			3-5 zi
		Analiza generală a urinei	Sol. Lincomycinum 30%-1ml	2mlx2 i/m	10 fiole	
		Bacteriologia vaginală	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		RW	Sol. Metamizoli natrium 50%- 2ml	2mlx2 i/m	6 fiole	
		USG	Sol. Diphenhydraminum 1%- 1ml	1ml x 2 i/m	6 fiole	

N71 Piometra (postavortivă,	medicina primară	Analiza generala a singelui	Sol. Nitrofuralem 1:400			
		urinei	Sol. Dioxydinum 1%-10ml			
		Bacteriologia vaginala	Ceftriaxonum 1,0	1,0 i/vx1zi		
		RW				
			Oxytocinum 5 Un/1ml	1mlx3ori/zi		
	spitalicesc	Analiza generala a singelui	Sol. Glucosum 5%-500,0ml i/v	500,0ml i/v	1 fl	
			Dilatarea c/c și lavajul c/u			
		Analiza generală a urinei	Sol. Natrii chloridum 0,9%-500 ml			
		Bacteriologia vaginala	Sol. Dioxydinum 1%-10ml	10ml		
		RW	Sol. Nitrofuralem 1:400			
		USG	Ceftriaxonum 1,0	1,0 i/vx1zi	10 fl	
		antibioticograma sin c/u	Oxytocinum 5 Un/1ml	1ml x 3ori/	15 fl	
		USG organelor genitale	Comp. Clemastinum 0,001	1px2ori	10 comp.	
		diagnostică	Natrii chloridum 0,9% - 500ml	500ml x 2 i/v	4 fl.	
Perivioperitonita, peritonită	spitalicesc	Analiza generala a singelui	Cefotaximum sau Ceftriaxonum	1,0x1	10 fl	10 zile
		Analiza generala a urinei	Sol. Metronidazolom 0,5%-100 ml	1f.x 2	10 fl	
		USG	Kanamycin * (in dren) 0,5			

		Chirurgul				
		Frotiu la gn				
		Fibrinogen				
		Coagulograma	Sol. Ketorolacum 3%-1ml	2 ml x 2		
		Flora din c/c și antibioticograma				
		Laparoscopie cu drenarea cav. abdominale	Sol. Natrii chloridum 0,9%-500ml	1 fl		
		ECG	Sol. Glucosum 5%-500ml	1 fl		
		Ureea	Sol. Glucosum 10%-500ml	1 fl		
		ALT, AST				
		Echilibrul acido-bazic	Sol. Pentoxifyllinum 2%-5ml	1f x 1		
E25 Sindrom adrenogenital	medicina primară	Hemograma	Progestine în faza a II-a a ciclului			8 zile
E28.2Sindromul ovarelor polichistice	medicina primară	Hemograma	Progestine în faza a II-a a ciclului			
		Analiza generala a urinei	Comp. Metforminum 500	500 mgx3 ori		
		RW	Comp. Prednisolonum 0,005	5mg/zi		7 zile
		Bacteriologia vaginala	Terapie metabolică lunar			
		Radiografia craniului				
		T3, T4, TSH, DHEA				
		FT, LH, Cortizon, testosteron				
		USG organelor genitale				

		Bacterioscopia vaginala				
		USG organelor genitale				
	spitalicesc		ovarian			3-5 zile
Uter bicorn	spitalicesc	Examen ginecologic	°Laparotomie - operatia Strasman			7 zile
		Ex.USG (organele genitale + sistemul urinar)	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Histerosalpingografia	Sol. Natrii chloridum 0.9 % - 500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Analiza generală a sîngelui	Sol. Glucosum 5 % -500 ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Glucosa sîngelui				
		Bilirubina tot/directă	Sol Promedol (Trimeperidinum) 2%-1,0	1ml i/m. x 2 ori	4fiole	
		Proteinele generale	Sol. Kalii chloridum 4% -40ml	40 ml x 2	160 ml	
		Coagulograma	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/mx3 ori/zi	9 fl.	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Metronidazolum 0,5%-100ml	100 ml x 2 i/v	2 fl.	
		RW	Ulei de ricin *30 ml	30 ml	1 fl.	
		Bacteriologia vaginala	Comp. Metronidazolum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	

		Analiza generala a urinei	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		ECG	Sup. Diclofenacum 100mg	1 sup	3 zile	
		Colposcopie	Oxytocinum 5UI/ml	1mlx2 ori/zi	2 fiole	
			Mănuși	3 perechi	9 perechi	
			Tifon	1 metru	7 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	140 ml	
			Povidoni iodidum 20ml	20 ml	140 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	70 ml	
			Măști	3 buc.	3 buc.	
			Catgut	fiole	4 fiole	
			Vicril	fiole	2 fiole	
			Dexoni	fiole	2 fiole	
			Metode fizice și active de tratament			
Sindromul Rokitanski-Küstner-						
	spitalicesc	Examen ginecologic	°Laparotomie+plastie vaginală (Colpopoeză peritoneală)			10 zile
		Examen USG (organele genitale + sistemul urinar)	°Laparoscopie [fixarea boltei vaginale]			
		Analiza generală a	Tratamentul medicamentos			
		Glucosa sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 %-500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Bilirubina tot/directă	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteinele generale	Sol. Glucosum 10 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Coagulograma				
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1 ml	1ml i/m. x 2 ori	4 fiole	
		Sînge la SIDA				

		RW	Sol. Clorură de potasiu 4%-40ml	40 ml x 2	160 ml	
		Bacteriologia vaginală	Comp. Fluconazolom 0,15	150 mg	1 comp.	
		Analiza generală a (adăugător)	Sup. Diclofenacum 100mg	1 sup	3 zile	
		EKG	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	6 fl.	
			Ulei de ricin *30 ml	30 ml	1 fl.	
			Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
			Mănuși	perechi	9 perechi	
			Tifon	1 metru	7 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	140 ml	
			Iodonat 20ml	20 ml	140 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu 3%-10ml	10 ml	70 ml	
			Măști	buc.	3 buc.	
			Metode fizice și active de tratament			
			Psihoterapie			
O.001	spitalicesc	Examen ginecologic	Tratamentul medicamentos (sarcină ectopică în evoluție, L 2-3 cm, fără			5 zile
		Examen USG (organele genitale + sistemul urinar)	Methotrexatum 50 mg i/m			
		Testul la b-HCG	Supraveghere US			
		Puncția Douglasului	°Laparoscopie diagnostică și chirurgicală (tubectomie, salpingostomie, rezectarea parțială a trompei; rezecție ovariană, ovariectomie, anexectomie)			
		Analiza generală a	°Laparotomie sau minilaparotomie (în			
		Proteina generală	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Bilirubina tot/directă	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	

			Sol. Glucosum 10 %	500ml i/v x 2	4 fl.	
		RW	Sol. Omnopon (Combinatie) 2%-1 ml	1ml i/m. x 2	4 fiole	
		HBs – antigen	Insulin 5ml	(8-16 UN)	24-64 UN	
		Bacteriologia vaginală	Sol.Kalii chloridum 4%	40 ml x 2	160 ml	
		Analiza general a urinei	Nadroparini calcium 0,3*	0.3 i.c.	5 seringi	
		Coagulograma	Ceftriaxonum 1,0*	1.0 i/v, i/m	3 fl.	
		(adăugător)	Ulei de ricin *	30 ml	1 fl.	
		ECG	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
			Comp. Fluconazolium 0,15	150 mg	1 comp.	
			Plasma proaspăt congelată, masă eritrocitară (la necesitate)			
			Mănuși	3 perechi	6 perechi	
			Tifon	1 metru	7 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	140 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	20 ml	140 ml	
O04 Avort medical (la dorință) pînă la 12 săptăm.	ambulator - (pînă la 10 săpt)/spital icesc -	Examen ginecologic	°Vacuum-aspirație manuală/electrică			1zi
		Analiza generală a	°Raclajul uterului			
		Examen USG	Sol. Lidocainum 1%-1ml	20ml în col	10 fiole	
		RW	Oxytocinum 5 UA/ml	1.0 i/m, i/v	1 fiolă	
		Bacterioscopia	Mănuși	3 perechi		
		Grupa sanguină, Rh	Comp. Doxycyclinum 100mg	0,1x2 ori 5 zile	10 comp.	

O04 Avort medical terapeutic (la cerere) la termen sub 9 săptămîni	medicina primară	Examen ginecologic	Comp. Mifepristonum 200mg	200mg	1 comp.	
		Examen USG	Comp. Misoprostolum 200mcg	200mcg	4 pastile	
		Grupa sanguină, Rh	Mănuși	2 perechi		
		Examen la maladii				
		Bacterioscopia				
O04 Întreruperea sarcinii la indicații medicale de la 12 săpt.pîna la	spitalicesc	Examen ginecologic	Comp. Mifepristonum 200mg	200mg	1 comp.	3-4 zile
		Analiza generală a	Comp. Misoprostol 200mcg	200mcg după		
		Analiza generală a	Oxytocinum 5 UA/ml	1,0 x 2 0ml	6 fiole	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Lincomycinum 30% -2 ml	2,0 i/m x 2	6 fiole	
		Protrombin, fibrinogen	Povidoni iodidum	10 ml	10 ml	
		Frotiu la gn	Seringi	5 ml	10 buc	
		RW	Seringi	10 ml	10 buc	
			Mănuși			
			Tifon			
O03 Avort spontan incomplet	spitalicesc	Examen ginecologic	°Vacuum-aspirație manuală/electrică			1 zile
		Analiza generală a	°Raclajul uterului			
		Analiza generală a	Anestezie generală i/v			
		Examen USG (la	Sol. Lidocainum 2%-2 ml	2 ml	3 fiole	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Natrii chloridum 0,9% - 10ml	10 ml	2 fiole	
		Frotiu la gn	Oxytocinum 5 UA/ml	1,0 x 2 0ml	2 fiole	

		RW	Sol. Lincomycinum 30% -2 ml	2,0 ml x 2	2 fiole	
			Sol. NaCl 0,9% - 500ml (la necesitate)	500ml i/v	2 fl.	
			Mănuși			
			Tifon			
Hematometră		Analiza generală a	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	2 fl.	3 zile
N85.7		Hematocritul	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	2 fl.	
		Coagulograma	Sol. Dextranum 40 -400ml	400ml i/v	1 fl.	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Tramadolium 5%-2ml	2ml i/m. x	6 fiole	
			Ceftriaxonum 1,0*	1.0 i/v, i/m	3 fl.	
		RW	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	10 comp.	
		Bacteriologia vaginala	Comp. Metronidazolium 0,5 *	0.5 x 3 ori	10 comp.	
		Analiza generala a urinei	Comp. Fluconazolium 0,15*	150 mg	1 comp.	
			Oxytocinum 5UA/ml	1.0 i/m., i/v	3 fiole	
			Plasma proaspăt congelată (la necesitate)			
			Mănuși	3 perechi		
			Tifon	3 metri		
Leziunea organelor bazinului mic și țesuturilor cauzate de	spitalicesc	Examen ginecologic	°Laparoscopie (coagularea sau suturarea perforației uterine)			5-7 zile
		Examen USG (org. bazinului mic + cavitatea abdominală)	°Laparotomie (suturarea perforației; histerectomie). (În dependență de leziunea uterului)			
		Radiografie abdominală	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Analiza generală a sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500 ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Glucosa sîngelui	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina generală	Sol. Glucosum 10 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	

			Sol Promedol (Trimeperidinum) 2%-1,0	1ml i/m. x 2 ori	4 fiole	
		Hematocritul				
		Coagulograma				
		Grupa sanguină, Rh				
		RW				
		Bacteriologia vaginală	Nadroparini calcium	0.3 i.c.	5 seringi	
		Analiza generală a urinei	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	5 fl.	
		EKG	Sol. Metronidazolum 0,5%-100ml	100 ml x 2	2 fl.	
		Chirurg	Ulei de ricin *	30 ml	1 fl.	
		Urolog	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
			Comp. Metronidazolum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
			Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
			Oxytocinum	1.0 i/m.	3 fiole	
			Mănuși	3 perechi	9 perechi	
			Tifon	1 metru	7 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	140 ml	
			Povidoni iodidum 50ml	20 ml	140 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	70 ml	
			Măști	3 buc.	3buc.	
Endometrioza		Examen ginecologic	°Raclajul uterului (hemoragii)			3-5 zile
		Examen USG	°Laparoscopie (endometrioza ovariană,			
		Studiu histologic	°Laparotomie			
		Analiza generală a	Tratamentul medicamentos			
		Glucosa sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina generală	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Bilirubina tot/directă	Sol. Glucosum 10 % -500ml	500ml i/v x 2	2 fl.	

		Coagulograma	Sol. Omnopon (Combinatie) 2%-1 ml	1ml i/m. x 2 ori	4 fiole	
		Grupa sanguină, Rh	Insulinum humanum 5ml (100 u/ml)	(8-16 UN)	24-64 UN	
		Analiza generală a	Sol. Kalii chloridum 4% 400ml	400ml x 2	160 ml	
		RW	Nadroparini calcium 0.3 s/c	0.3 i.c.	5 fiole	
		HBs-antigen	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	3 fl.	
		Bacteriologia vaginala	Comp. Metronidazolum 0,5	100 ml x 2	2 fl.	
		ECG	Ulei de ricin *	30 ml	1 fl.	
		R-ö toracică	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		(Adăugătoare)	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		Rectoromanoscopie	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
		Cistoscopie	Tifon	1 metru	7 metri	
		Cistografie	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	140 ml	
		Urografie excretorie	Povidoni iodidum 50ml	20 ml	140 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	70 ml	
			Măști	3 buc.	3 buc.	
Prolaps uterin și vaginal	spitalicesc spitalicesc	Examen ginecologic	°Operația Manchester cu colpoperineoplastie sau cleizie.			6 zile
Prolaps a bontului uterin	Spitalicesc	Grupa sanguină, Rh				
		Examen USG	°Operația Neugebauer – Le Fort cu			
		Studiu histologic	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Analiza generală a sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	

		Glucoza sîngelui	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina generală	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1 ml	1ml i/m. x 2	4 fiole	
		Bilirubina tot/directă	Insulinum humanum 5ml (100 u/ml)	(8-16 UN)	24-64 UN	
		Grupa sanguină, Rh	Nadroparini calcium 0.3	0.3 s/c.	3 fl.	
		RW	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	3 fl.	
		HBs-antigen	Metronidazolium 0,5%-100 ml	100 ml x 2 i/v	2 fl.	
		Bacteriologia vaginala	Ulei de ricin *	30 ml	1 fl.	
		Analiza generală a urinei	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		Coagulograma	Comp. Metronidazolium 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		ECG	Comp. Fluconazolium 0,15	150 mg	1 comp.	
		Colposcopie	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
			Tifon	1 metru	6 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	120 ml	
			Povidoni iodidum 20ml	20 ml	120 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	60 ml	
			Măști	3 buc.	3 buc.	
Cistocel	spitalicesc	Examen ginecologic	°Colporafie anterioară cu sau fără			6 zile
		Examen USG	Tratamentul medicamentos			
		Colposcopie	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Studiu histologic	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Analiza generală a	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1 ml	1ml i/m. x 2	4 fiole	
		Glucoza sîngelui	Insulinum humanum 5ml (100 u/ml)	(8-16 UN)	24-64 UN	
		Proteina generală	Nadroparini calcium 0.3	0,3 s/c	5 seringi	
		Bilirubina tot/directă	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	3 fl.	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Metronidazolium 0,5%-100ml * *	100 ml x 2	2 fl.	

		RW	Ulei de ricin *	30 ml	1 fl.	
		HBs- antigen	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		Bacteriologia vaginala	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		Analiza generală a urinei	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
		Coagulograma	Tifon	1 metru	6 metri	
		ECG	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	120 ml	
			Povidoni iodidum 20ml	20 ml	120 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	60 ml	
			Măști	buc.	3 buc.	
Incontinență urinară cu sau fără cistocel	spitalicesc	Examen ginecologic	°Colporafie anterioară (după Martin,			6 zile
		Examen USG	°Operația Kelly			
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Glucoza sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina generală	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Bilirubina tot/directă	Sol. Dextranum 70	400ml i/v	1 fl.	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1 ml	1ml i/m. x 2	4 fiole	
		RW	Nadroparini calcium 0.3	0,3 s/c	3 seringi	
		HBs- antigen	Sol. Lincomycinum 30%-2ml	2ml i/m x 2	12 fl.	
		Bacteriologia vaginala	Metronidazolum 0,5%-100ml	100 ml x 2	2 fl.	
		Analiza generala a	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		Coagulograma	Mănuși	3 perechi	9perechi	
		EKG	Tifon	1 metru	6 metri	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	120 ml	
			Povidoni iodidum 20ml	20 ml	120 ml	

			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	60 ml	
			Măști	3 buc.	3 buc.	
Rectocel	spitalicesc	Examen ginecologic	°Colpoperineoplastie sau cleizie.			6 zile
		Examen USG	Tratamentul medicamentos			
		Analiza generală a sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Glucosa sîngelui	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina generală	Sol. Omnopon (Combi-nație) 2%-1 ml	1ml i/m. x 2	4 fiole	
		Bilirubina tot/directă	Nadroparini calcium 0.3	0,3 s/c	3 seringi	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Lincomycinum 30%-2ml	2ml i/m x 2	12 fl.	
		RW	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		HBs-antigen	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
		Bacteriologia vaginala	Tifon	1 metru	6 metri	
		Analiza generala a urinei	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	120 ml	
		Coagulograma	Povidoni iodidum 20ml	20 ml	120 ml	
		EKG	Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	60 ml	
			Măști	3 buc.	3 buc.	
Prolaps uterin și vaginal incomplet	spitalicesc	Examen ginecologic	°Operația Manchester cu colpoperineoplastie sau cleizie.			6 zile
		Examen USG	°Colporafie anterioară cu colpoperineoplastie sau cleizie.			
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos			
		Glucosa sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 % 500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina generală	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Bilirubina tot/directă	Sol. Omnopon (Combi-nație) 2%-1 ml	1ml i/m. x 2 ori	4 fiole	
		Grupa sanguină, Rh	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
			Insulinum humanum 5ml (100 u/ml)	(8-16 UN)	24-64 UN	

		RW	Nadroparini calcium 0.3	0,3 s/c	3 seringi	
		HBs- antigen	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	3 fl.	
		Bacteriologia vaginala	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
		Analiza generala a urinei	Tifon	1 metru	6 metri	
		Coagulograma	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	120 ml	
		EKG	Povidoni iodidum 20ml	20 ml	120 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	60 ml	
			Măști	3 buc.	3385 buc.	
Prolaps al bontului vaginal	spitalicesc	Examen ginecologic	°Operația Neugebauer – Le Fort cu colpocleizie			6 zile
		Examen US	°Colpopexie			
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Glucoza sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina generală	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Bilirubina tot/directă	Sol. Omnopon (Combinăție) 2%-1 ml	1ml i/m. x 2 ori	4 fiole	
		Grupa sanguină, Rh	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		RW	Insulinum humanum 5ml (100 u/ml)	(8-16 UN)	24-64 UN	
		HBs- antigen	Nadroparini calcium 0.3	0,3 s/c	3 seringi	
		Bacteriologia vaginala	Ceftriaxonum 1,0*	1.0 i/v, i/m	3 fl.	
		Analiza generala a urinei	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
		Coagulograma	Tifon	1 metru	6 metri	
		EKG	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	120 ml	
			Povidoni iodidum 20ml	20 ml	120 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	60 ml	

			Măști	3 buc.	3 buc.	
Hipertrofia colului uterin	spitalicesc	Examen ginecologic	°Amputarea colului uterin (cuneiformă; după Sturmdorf)			5 zile
		Examen US	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Analiza generală a sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Glucosa sîngelui	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina generală	Sol. Promedol (Trimeperidinum) 2%-1,0	1ml i/m. x 2	4 fiole	
			Nadroparini calcium 0.3	0,3 s/c	3 seringi	
		Grupa sanguină, Rh	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	5 fl.	
			Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		RW	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
			Tifon	1 metru	6 metri	
		Bacterioscopia vaginala	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	120 ml	
		Analiza generală a urinei	Povidoni iodidum 20ml	20 ml	120 ml	
		Coagulograma	Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	60 ml	
		Exam. Histologic	Măști	3 buc.	3 buc	
		ECG				
Elongarea colului uterin	spitalicesc	Examen ginecologic	°Amputarea colului uterin (cuneiformă; după Sturmdorf)			5 zile
		Examen USG	°Operația Manchester cu colpoperineoplastie sau cleizie			
		Analiza generală a sîngelui	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Glucosa sîngelui	Sol. Natrii chloridum 0.9 % - 500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Proteina generală	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	

		Grupa sanguină, Rh	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0,5 x 3 ori	15 comp.	
			Sol Promedol (Trimeperidinum) 2%-1,0	1ml i/m. x 2 ori	4 fiole	
		RW	Nadroparini calcium 0.3	0,3 s/c	3 seringi	
			Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	5 zile	
		Bacteriologia vaginala	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		Analiza generală a urinei	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
		Coagulograma	Tifon	1 metru	6 metri	
		Examen morfopatologic	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	120 ml	
		ECG	Povidoni iodidum 20ml	20 ml	120 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	60 ml	
			Măști	3 buc.	3buc	
Prolaps vaginal + miom uterin pînă la 12 săptămîni	spitalicesc	Examen ginecologic	°Extirparea vaginală a uterului			7 zile
		Examen US	°Laparotomie (histerectomie cu fixarea lig. Rotunde și plastie antero-posterioară)			
		Colposcopie	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Studiu histologic	Sol. Natrii chloridum 0.9 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Analiza generală a sîngelui	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	4 fl.	
		Glucosa sîngelui	Sol. Omnopon (Combi-nație) 2%-1 ml	1ml i/m. x 2 ori	4 fiole	
		Proteina generală	Nadroparini calcium 0.3	0,3 s/c	3 seringi	
		Bilirubina tot/directă	Ceftriaxonum 1,0	1.0 i/v, i/m	5zile	

		Grupa sanguină, Rh	Ulei de ricin *	30 ml	1 fl.	
		RW	Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		HBs- antigen	Comp. Metronidazolom 0,5	0.5 x 3 ori	15 comp.	
		Bacterioscopia vaginala	Comp. Fluconazolom 0,15	150 mg	1 comp.	
		Analiza generală a				
		Coagulograma	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
			Tifon	1 metru	7 metri	
		EKG	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	140 ml	
			Povidoni iodidum 20ml	20 ml	140 ml	
			Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml	10 ml	70 ml	
			Măști	3 buc.	3 buc.	
Sterilitate de geneza feminină	spitalicesc	Examen ginecologic	°Laparoscopie diagnostică și chirurgicală (salpingoovarioliză, rezecții ovariene, diatermopuncția ovarelor, salpingostomii, salpingoplastii etc.)			1-3 zile
		Examen USG	°Histeroscopie			
		Histerosalpingografie	Tratamentul medicamentos postoperator			
		Studiu histologic	Sol. Natrii chloridum 0.9 % - 500ml	500ml i/v x 2	2 fl.	
		Analiza generală a sîngelui	Sol. Glucosum 5 % -500ml	500ml i/v x 2	2 fl.	
		Glucoza sîngelui	Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml	2ml i/m x 2	6 fiole	
		HBs-antigen	Sol. Difenilhidramină 1%-1ml	1 ml i/m x 2	6 fiole	
		Grupa sanguină, Rh	Sol. Lincomycinum 30%-2ml	2 ml i/m x 2	6 fiole	
			Comp. Acidum acetylsalicylicum 0,5	0.5 x 3 ori	6 comp	
		RW	Mănuși	3 perechi	9 perechi	
		Bacteriologia vaginala	Tifon	1 metru	3 metri	
		Analiza generală a urinei	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml	20 ml	60 ml	

		(Adăugător)	Povidoni iodidum 20ml	20 ml	60 ml	
		Coagulograma	Sol. Permanganat de potasiu 3%-10ml	10 ml	30 ml	
		ECG	Măști	3 buc.	3 buc.	
		R-ö șei turcești în 2 proiecții	Metode fizice și active de tratament			
		Studiu hormonal:				
		HFS, HL, estrogeni, progesteron, prolactin	LFC			
		Endocrinologul				
			(Adăugător)			
			Acopunctură			
Disfuncții ale ciclului menstrual	medicina primară	Examen ginecologic				1 zi
			Tratamentul medicamentos			
		Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml	2ml i/m x 2	6 fiole	
		Grupa sanguină, Rh	Oxytocinum 5 UA/mlit.	1	1 fiolă	
		Analiza generală a RW	Mănuși	perechi	3 perechi	
		Bacteriologia vaginala				
	spitalicesc		Raclajul uterin fractionat diagnostic			1-3 zile
		examenul ginecologic	Sol. Lincomycinum 30% -2ml	2ml x 2 i/m	6 fiole	
		Examen USG	Oxytocinum 5 UA/ml.	1 x2 i/m	3 zile	
		Analiza generală a sîngelui	Mănuși	perechi	3 perechi	

		Bacteriologia vaginală	Tifon	metri	1 metru	
			Sol. Hydrogenii peroxydum 3% - 50ml		20 ml	
		RW				
		HBs-antigen	Sol. Permanganat de potasiu * 3%-10ml		10 ml	
		Grupa sanguină, Rh	Contraceptive orale combinate (Reghividon, Regulon)	3-5 comp./zi	21 comp.	
		(Adăugător)	Progestine(Dufaston,Norcolut)	3-5 comp./zi	21 comp.	
		Coagulograma	Comp. Preparate de fier	1p/zi		
		Diagnosticul instrumental				
		ECG				
		HFS, HL, estrogeni,				
N85.6		Sinehii Hemograma	Histeroscopie cu indepartarea sinehiilor			1-3 zile
		Analiza generala a	Raclaj uterin fractionat. Montarea			
		RW	Sol. Lincomycinum 30%-1ml	2mlx2 i/m	6 fiole	
		Bacteriologia vaginala	Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	1 comp.	
		HSG	Sup. Diclofenacum 100mg	1 sup	3 sup	
		Histeroscopie				
N92.0						
Polimenoree cu ciclul menstrual ritmic	medicina primară	Examenul ginecologic	Oxytocinum 5 UA/ml i/m	1,0/zi		
		Hemograma pre și post menstrual	Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml	2ml i/m x 2		
		Analiza generala a urinei	Hemostaza hormonală în depen.de vîrstă			

		RW	Contraceptive orale combinate			
		Timpul de coagulare	(Regividon (Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum))	3-5comp/zi	21 comp.	
		Bacteriologia vaginala	Progestine(Dufaston,Norcolut)	3-5comp/zi	21 comp.	
	spitalicesc	Hemograma pre și post menstrual	Histeroscopie			1 zi
		Analiza generala a urinei	Raclaj uterin diferentiat			
		RW	Examen histologic			
		B-HG	Oxytocinum 5 UA/ml i/m	1,0/ x 2 i/m	10 fiole	
		LH,TSH,T3,T4,CA-125	Sol. Etamsylatum 12,5%-2ml	2ml i/m x 2	6 fiole	
		Coagulograma	Hemostaza hormonală în depen.de vîrstă			
		EKG	(Regividon (Ethinylestradiolum +	3-5comp/zi	21 comp.	
		Bacteriologia vaginala	Progestine (Dufaston,Norcolut)	3-5comp/zi	21 comp.	
			Tratament antianemic			
			Preparate de fier	1comp/zi		
N85	medicina primară	Hemograma	Progestive			
Hiperplazia		Analiza generala a urinei	Comp. Dydrogesteronum 0,01	10 mgx2 ori		
		RW	Comp. Linestrenol * 0,005	5 mg/zi		
		Bacteriologia vaginala	Estrogen- Gestogeni combinate			
			Marvelon	3p/zi		
			Regividon (Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum)	3-5p/zi		
			Tratament antianemic			

			Preparate de fier	1p/zi		
	spitalicesc	Hemograma	Progestive			1-3 zile
		urinei	Comp. Dydrogesteronum 0,01	10 mgx 2 ori	6 comp	
		RW	Comp. Linestrenol * 0,005	5 mg/zi	3 comp	
		Bacteriologia vaginala	Estrogen- Gestogeni combinate			
		Usg org. genitale				
		uterin diferenciat repetat	Regividon (Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum)	3-5p/zi		
		FSH, LH	Preparate de fier	1p/zi	3 comp	
		RW				
Chlamidioze cronice	medicina primară	Examen frotiu și ser la chlamidia trohomatis				
			Comp. Clarithromycinum 0,5			
Ureoplasmoze cronice	medicina primară	determinarea antigenilor și anticorpilor la	Comp.Doxycyclinum 0,1			
			Comp. Ciprofloxacinum + Tinidazolum 0,5			
			Comp. Fluconazolum 0.15	500 mgx 2/zi		
			Băițe vaginale cu Sol. Hydrogenii peroxydum 3%-30ml	150mg x1, 6 zi		
			Ung. Erythromycinum 7,0(1000 UA)	3%- 30ml		
			Instilația uretrei cu Sol. Dioxydinum 1%-10ml	5,0x10 proc		
			Histeroinstilația cu Sol. Metronidazol 0,5%- 20ml sau	10mlx10 proc		
			Sol. Dioxydinum 1%-10ml	proc.		

Vulvovaginita (bacterială,	medicina primară		Tratamentul			
		1. Hemograma				
		2. Analiza generală a urinei	1.Antibiotice (după antibioticogramă, 7 zile	Doza		
		3. Coprograma	Comp. Erythromycinum 0,25	0,25x4 ori/zi		
		4. Frotiu la GN	2.Preparate H1- antihistaminice			
		eliminărilor din vagin	Comp. Chloropyraminum 0,025	0,025x2ori/zi		
		6. Vaginoscopia	3.Comp. Metronidazol 0,25	0,25x4ori/zi		
		7. Analiza sîngelui la glucoză	4.Comp. Fluconazol 0,15	50mg 1,5 zi		
		8. ORL	5. Sol. Nitrofuralem 1:5000-200 ml	200ml		
			6. Sol. Hydrogenii peroxydum 3%-200ml	200ml		
			7. Supp. Vaginale Polyjynax-virgo (Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum) 1 supp.x pe zi, 6 zile	1 sup		
			8. Aplicații cu Lin. Syntomicini (Chloramphenicol) 5%-25,0	5%	1 tub	
			Ung. Levomecol (Chloramphenicol + Methyluracilum)40,0	40%	1 tub	
	spitalicesc	1. Hemograma				7 zile
		2. Analiza generală a urinei	1.Antibiotice (după antibioticogramă, 7 zile			
		3. Coprograma	Comp. Erythromycinum 0,25	250 mgx4 ori pe zi	28 comp	
		4. Frotiu la GN	2.Preparate H1- antihistaminice			
		5. Analiza sîngelui la glucoză	Comp. Chloropyraminum 0,025	0,025x2ori/z	14 comp	
		pediatrul	3.Comp. Metronidazol 0,25	0,25x4ori/zi	12 comp	

		Fizioterapeut	4. Nystatinum 500 000UA	500000UAx4 ori pe zi	28 comp	
			5. Sol. Nitrofuralem 1:5000- 200ml	200ml		
			6. Sol. Hydrogenii peroxydum	200ml		
			7. Supp. Vaginale Polyjynax-virgo (Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum) 1 supp.x pe zi, 6 zile	1 sup	7 zile	
			8. Aplicații cu Lin. Syntomicina (Chloramphenicolum) 5%-25,0			
			Ung. Levomecol (Chloramphenicolum + Methyluracilum) 40,0		1 tub	
N94 Alte afecțiuni ale vulvei la fetițe (sinehii a labiilor mici, distrofia vulvei)	medicina primară	Analiza generala a singelui	Aplicații pe vulvă cîte 1 microirigator, 7 zile		7 microirigatoare	
		Analiza generală a urinei				
		eliminărilor din vagin la flora bacteriană și g.				
N91 Amenoree primară, secundară, hipomenoree, oligomenoree, opsomenoree	medicina primară	1. Hemograma				

		2. Analiza generală a urinei	1. Sol. Progesteronum 1% 2 ml	1% 2 ml, i/m	10 fiole	
		3. Bacteriologia vaginală	2. Ethinylestradiolum (doar în combinație) 0,00005	00005x1 ori pe	7 fiole	
		Fizioterapeutul	3. Preparate estrogen-progestive sintetice cu o concentrație redusă de estrogene și progestative			
			Seringi 2 ml			
	spitalicesc	1. Hemograma	1. Sol. Progesteronum 1% 2 ml	1%-2ml	10 file	10-12 zile
		2. Analiza generală a urinei	2. Ethinylestradiolum (doar în combinație) 0,00005	00005x1 ori pe	10 file	
		3. Frotiu la GN	3. Preparate estrogen-progestive sintetice cu o concentrație redusă de estrogene și progestative			
		genitale	endonazală cu Sol. Tiamina 5%-1ml			
		5. Ecografia glandei tiroide				
		6. Ecografia organelor interne				
		7. Ecografia glandelor suprarenale				
		8. Oftalmoscopia				
		craniului+șeaua				
		10. Echo-EG				
		hormoni				
		FSH,				
		LH,				

		prolactin,				
		E2 progesteron				
		12.Urina la 17CS				
		13.Oftalmologul				
		14.Pediatrul				
		15. Fizioterapeut				
Salpingooforit	medicina primară	1. Hemograma	Terapia antibacteriană conform antibioticogramei			
		2. Analiza generală a urinei	1.Cefazolinum 1,0	1,0x3 ori pe zi i/m		
		3. Frotiu la GN	2. Comp. Metronidazolom 0,25	0,25x3ori/zi		
		4.Însămînțarea eliminărilor din vagin la flora bacteriană				
		6.RW sînge				
		7. SIDA sînge				
		8. Consultația ORL				
	spitalicesc	1. Hemograma	Terapia antibacteriană conform antibioticogramei			7 zile
		urinei				
		3. Frotiu la GN	1.Cefazolinum 1,0	1,0x3 ori pe zi i/m	21 fl	
		4.Însămînțarea eliminărilor din vagin la flora bacteriană	2.Comp. Metronidazolom 0,25	0,25x3ori/zi		
		5. Ecografia organelor genitale	3.Proceduri fizioterapeutice			

		6.RW Sînge	4.Sup. Diclofenacum 100mg	100mgx1 dată		
			5.Sol. Metronidazolium 100ml	100x 2 ori i/v	7 sup	
		7. Consultația ORL				
		8. Pediatru				
		9. Proctolog				
		10. Chirurg				
		11. Fizioterapeut				
Pubertate precoce	spitalicesc	1. Hemograma	Intervenție chirurgicală (tumoare ovariană)			7 zile

		genitale				
		3.Echo-Eg				
		4.EEG				
		5.Rg-grafia mîinii (vîrsta oaselor)				
		hormoni				
		FSH				
		LH,				
		prolactina				
		17cetosteroidi				
		8. Oftalmolog				
		9. Neurolog				
		10. Endocrinolog				
		11. Pediatrul				
		Fizioterapeutul				
E92						
Hemoragie						
uterină						
disfuncțională						
juvenilă	spitalicesc	1. Hemograma	1. Internare urgentă			7 zile
		2. Trombocite	2. Tratament simptomatic:			
		3. Timpul coagulării	Sol. Calcii chloridum 10% 10ml i/v 7 zile	10 ml i/v	7 fiole	
		4. Grupa de sînge, Ku factor				
		5. Coagulograma				
		6. Sînge la RW				
		7. Sînge la SIDA				
		5. Ecografia organelor genitale				
		6. Ecografia organelor interne				

		tiroide				
		8. Analiza singelui la hormoni	Preparate estrogen-progestive sintetice cu o concentrație redusă de estrogene și			
		FSH	3. Preparate de Fe			
		LH,				
		prolactina,	4.Proceduri fizioterapeutice			
		9.Echo-EG				
		10. Pediatru	Seringi 2			
		11. Endocrinolog	Seringi 20			
		12.Hematolog				
		13.Oftalmolog				
		14. Fizioterapeut				
E30						
Pubertate întârziată	medicina primară	1. Hemograma				
		2. Analiza sumară a urinei	1. Ethinylestradiolum (doar în combinație) 0,00005x1 ori pe zi, 10 zile	0,00005x1 ori pe zi		
		3. Frotiu la GN	2. Sol. Progesteronum 1% 2ml i/m, 5 zile, curs 10 ml	1%-2ml		
	spitalicesc	1. Hemograma	1. Comp.Ethinylestradiolum (doar în combinație) 0,00005x1 ori pe zi, 10 zile curs 10 ml	0,00005x1 ori zi	10 comp	10 zile
				1% 2 ml i/m	5 fiole	
		3. Frotiu la GN				
		4. AST, ALT				
		5. EchoEG				

		6. EEG				
		7. Oftalmoscopia				
		8. Rg-grafia craniului+șeaua				
		9. Rg-grafia mîinii				
		10. Ecografa glandei tiroide				
		11. Ecografa organelor genitale interne+rinichilor				
		13. Vaginoscopia				
		14. Corpi Bara				
		15. Sumarul urinei la 17CS				
		16. Colpocitilogie				
		17. Cariotip				
		18. Analiza sîngelui la				
		19. Pediatrie				
		20. Neurolog				
		21. Endocrinolog				
		22. Genetic				
		23. Oftalmolog				
		24. Fizioterapeut				
		25. Kinetoterapeut				
		26. Scintigrafia glandei tiroide				
EZO						
Sindromul ovarelor polichistice,	medicina primară	1. Hemograma	Comp.Ethinylestradiolum + Cyproteronum 1 comp..x1 ori pe zi, 21zile.	1 com.x 1ori pe zi	21 comp	

		2. Analiza sumară a urinei				
		3. Frotiu la GN				
	spitalicesc	1. Hemograma				5 zile
		2. Analiza sumară a urinei	Comp. Ethinylestradiolum + Cyproteronum 1 comp..x1 ori pe zi, 21zile.	1com. x 1ori pe zi	21 comp	
		3. Frotiu la GN				
		4. R-grafia craniului+șeaua turcească				
		5.Echo-EG				
		6.EEG				
		7.Oftalmoscopia				
		8. Ecografia organelor genitale				
		9. Ecografia glandei suprarenale				
		10. Analiza sîngelui la hormoni				
		FSH,				
		LH,				
		prolactina,				
		E2 progesteronă,				
		testoste-ron,				
		ACTH,cortizol,				
		DHEAS				
		11. Urina la 17CS				

		12. Neurolog				
		13. Endocrinolog				
		14. Oftalmolog				
		15. Genetic				
		16. Fizioterapeut				
Sindromul hipotalamic a perioadei pubertane	medicina primară	1. Hemograma	1.Valeriana officinalis L. 1com.x 3 ori pe zi, 10 zile	1 com.x 3 ori pe zi, 10 zil	30 comp	
		2. Analiza sumară a urinei	2. Piracetamum 0,4x2 ori pe zi, 10 zile	1 com.x 3 ori pe zi, 10 zile	30 comp	
		3. Frotiu la GN	3.Comp. Spironolactonum 25 mgx2ori pe zi, 10 zile	25 mgx2ori pe zi, 10 zil	20 comp	
			4. Sol. Progesteronum 1% 2ml i/m, 5 zile (tes	1%-2ml	10 fiole	
		1. Hemograma	1.Valeriana officinalis L. 1 comp.x 3 ori pe zi, 10 zile	1x3ori zi	30 comp	
		2. Analiza sumară a urinei				
		3. Frotiu la GN	2.Comp. Piracetamum 0,4x2 ori pe zi, 10 zile	0,4x2ori zi	20 comp	
		4. Echo-EG				
		5. EEG	3.Comp. Spironolactonum 25 mgx2ori pe zi, 10 zile	25 mgx2ori pe z	20 comp	

		6. Rg-rafia craniului+seaua turcească				
		7. Ecografia glandei tiroide	4.Inductotermia bitemporală 10 zile			
		8. Ecografia organelor genitale				
		9. Analiza sîngelui la hormoni FSH, LH, prolactina, E2 progesteronă, testosteron,ACTH,cortizol, DHEAS				
		10. Oftalmoscopia				
		11. Tomografia computerizată	6. Sol. Progesteronum 1% 2ml i/m, 5 zile (tes	1% 2 ml i/m	10 fiole	
		12. Neurolog				
		13. Neurochirurg				
		14. Endocrinolog				
		15. Glucoza sîngelui				
		16. Fizioterapeut				
N93	medicina primară					
Algodismenoree		1. Hemograma urinei	1. Supp. Diclofenacum 100mg.x 2ori pe zi,p/rectum 3 zile zi, 3 zile, în timpul ciclului menstrual	100mg.x 2ori pe zi, pe zi,	6 sup 9 comp	
		3. Frotiu la GN	3.COC			

			4.Vitaminoterapie			
		1.Hemograma	zi, p/rectum 3 zile	2ori pe zi,		7 zile
		2. Analiza sumară a urinei				
		3. Frotiu la GN	2.Comp. Indometacinum 25mgx3ori pe zi, 3 zile, în timpul ciclului menstrual	25mgx3ori pe zi	9 comp	
		4. Ecografia organelor genitale	3.COC			
		5. Oftalmoscopia	4.Proceduri fizioterapeutice			
		6. Echo-EG	5.Vitaminoterapie			
		7. Proba Mantu				
		8. Neurolog				
		9.Oftalmolog				
		10.Fizioterapeutul				
		11.Chirurg				
		12.Gastrolog				
E34						
Sindromul						
adrenogenital	medicina					
al perioadei	primară	1. Hemograma				
de pubertate		2. Analiza sumară a urinei	Comp. Ethinylestradiolum + Cyproteronum 1 comp..x1 ori pe zi, 21zile.	1 comp..x1 ori pe zi, 21zi	21 comp	
		1. Hemograma	1.Comp. Dexamethasonum 2mg x 1 ori pe zi, 10 zile	2mg x 1 ori pe zi	10 comp	
		2. Analiza sumară a urinei				
		3. Teste de vârstă osoasă (vârsta osoasă)				

		4. Ecografia organelor genitale				
		5. Ecografia glandelor suprarenale				
		6. Urina la 17CS				
		7. Analiza sîngelui la hormoni: testoste-ron, ACTH, cortizol, DHEAS				
		8. Hemograma computerizată a gl. Suprarenale				
		9. Endocrinolog				
		10. Ftiziatru				
		11. Genetic				
Anomalie de	spitalicesc	1. Hemograma urinei	secția de ginecologie operativă			7 zile
		3. Vaginoscopia				
		4. Ecografia organelor genitale				
		5. Ecografia organelor interne+rinichilor				
		6. Genetic				
		7. Chirurg				
		8. Urolog				
M63	medicina					
Mastopatia	primară	1. Hemograma	1. Mastodinon (combinație) 50ml-30 pic.x 2 ori pe zi, 8 zile	30 pic.x 2 ori pe zi,		
		2. Analiza sumară a urinei	2. Spironolactonum 25mgx2 ori pe zi, 8zile.	25mgx2 ori pe zi	16 comp	

		1. Hemograma	1.Mastodinon (combinație) 50ml-30 pic.x 2 ori pe zi, 8 zile	30 pic.x 2 ori pe zi,		8 zile
		2. Analiza sumară a urinei				
		3. Ecografia organelor genitale	2.Spironolactonum 25mgx2 ori pe zi, 8zile.	25mgx2 ori pe zi	16 comp	
		4. Ecografia glandelor mamare				
		5. Ecografia glandei tiroide				
		6. Endocrinolog				
		7. Mamolog				
		8. Analiza sîngelui la hormoni:T3, T4, TSH, prolactină	1. Comp. Chloropyraminum	1comp.x2 ori 7 zile	14 comp	
N76						
Vulvovaginită autoimună	medicina primară	1. Hemograma	2. Tratament local			
		2. Analiza sumară a urinei	Sol. Nitrofuralum 1:5000, 200ml			
		3. Frotiu la GN	i/vaginal			
			Ung. Nitroglycerinum-aplicații pe vulvă x3ori pe zi, 7 zile			
		1. Hemograma	1. Comp. Chloropyraminum	1comp..x2 ori	14 comp	
		2. Analiza sumara a urinei	2. Tratament local			

		3. Frotiu la GN	Sol. Nitrofuralem 1:5000, 200ml			
		4. Însămînțarea eliminării din vagin la flora bacteriană și gr. Gen. Candida	Supp. Diclofenacum 0,1 -50mgx1 ori pe zi i/vaginal	50mgx1 ori pe zi i/vaginal		
		5. Coagulograma				
		6. Trombocite				
		7. Timpul coagulării				
		8. Factor reumatoid	Ung. Nitroglycerinum-aplicații pe vulvă x3ori pe zi, 7 zile			
		9. Proteina C reactiva reactivă				
		10. Vaginoscopia				
		11. Examinarea chlamidii, herpes				
		micoplazmoză				
		12. Pediatriul				
		13. Reumatolog				
		14. Hematolog				
		15. Gastrolog				
		16. Alergolog				
N73 Sindrom F	medicina	1. Hemograma	1. Comp. Azithromycinum 0,25	250 mg x1 ori 5 zile		
	primară	2. Analiza sumară a urinei				
		3. Frotiu la GN	2. Supp. Diclofenacum 0,1-50 mg x 2ori pe zi rectal, 7 zile	2ori pe zi rectal, 7 zile		
		Reacția de polimerizare	Aplicații pe vulvă Ung. Tetracilină x 2 ori pe zi,	1 flc		
		4. Însămînțarea la chlamidii				

		1. Hemograma	1.Comp. 0,25	0,25x1-5zile		
		2. Analiza sumară a urinei				
		3. Frotiu la GN	2. Supp. Diclofenacum 0,1- 50mgx2ori pe zi rectal, 7 zile	2ori pe zi rectal, 7 zile		
		4. Însămînțarea la chlamidii				
		5. Factor reumatoid				
		6. Pediatrul				
		7. Oftalmolog				
		8. Reumatolog				
		9. ECG				
		10. Echo-EG				
		11. CIC				