

STANDARDELE
MEDICALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
ÎN NEUROCHIRURGIE ADULT

CIM Entitatea nozologica	Etapa acordarii asistentii medicale	Denumirea comuna internationala a investigatiilor	Numarul investigatiilor	Tratamentul: substanta/manopera	Doza, Entitatea de masura
C 70.0 - C70.9 TUMORĂ MALIGNĂ ALE MENINGELUI					
C 70.0-C70.9 TUMORĂ MALIGNĂ ALE MENINGELUI	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Tab. Triampur compozitum *	p/o, 1 pe zi
		Trimiterea la neurolog	1	Tab. Paracetamolium 500 mg	p/o. 1x2 ori/zi
		II. Paraclinice			
	b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiiei			
		Radiografia craniană	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi
		Examene de laborator	1		
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiiei			
			1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2.0 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		CT cerebral	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x4 ori/zi
		IRM cerebral	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi

		Radiografia pulmonară	1	Tab Carbamazepinum 400 mg	1x2 ori zi
		ECG	1	Sol. Furosemidum 1%-2 ml	i/m 1 xzi
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei		Sol. Ceftazidimum 1 g	i/m 1,0x4 ori/zi
				Sol. Metronidazolum 500 mg	1/v 3xzi
		IRM (nativ si cu contrast)	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
		CT cerebral (CT angio)	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2.0 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Consultatia internistului	1		
		Consultatia oftalmologului	2	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		Consultatia ORL	1	Sol. Etamsylatum 12,5% - 2ml	i/m. 2,0x3 ori/zi
		Consultatia oncologului	1	Sol. Nadroparini calcium 0,3 ml seringa preumpluta	s/c 0,3 ml /zi
		Consultația anesteziologului	1	Sol. Kalii chloridum 4%- 10 ml	i/v. 20 ml/zi
		Consultația reanimatologului	1	Tab. Carbamazepinum 400 mg	2xzi
			1	Sol. Magnesii sulfas 25% - 5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		II. Paraclinice		Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	400,0x2 ori/zi
		Analiza generală a sangelui	1	Sol. Amitriptylinum 1% - 2ml	i/m 2mlxzi
		Sumarul urinei	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 0,2% - 2ml	i/m. 2,0x1 1/zi
		Glicemia	1	Sol. Aminophyllinum 2,4% - 5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		Grupa de sange & Rh factor	1		
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% - 5ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Ureea	1	Sol. Furosemidum 1% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		Coagulograma	1	Sol. Tramadolium 5%-2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi

		Ionogramma	1	Caps. Fluconazolum 150 mg	1 caps /zi
		MRS	1	Sol. Mannitolum 15% - 500 ml	500 ml
		Rx cutiei toracice	1	Sol. Metilprednizolonum 500 mg	i/v 30 mg/kcorp
		Examen histologic	1	Sol. Ambroxolum 30mg	150 ml
		Monitoring electrofiziologic		Sol. Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum) 500 ml	500 ml
		ECG	1		
				Sol. Acidum ascorbicum 10 % - 5ml	5 ml x 2 ori
				Sol. Azametoniu bromid * 5% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
				Dren spinal	
				Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Povidoni iodidum	uz extern
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Viridum nitens 1%-10ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1%-100ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Pentru zonele elocvente	
				Operația: Ablația tumorii	
				Duroplast, Burete hemostatic, Bioclei	
				Anestezie totală cu VA	

CIM Entitatea nozologica	Etapa acordarii asistentei medicale	Denumirea comuna internationala a investigatiilor	Numarul investigatiilor	Tratamentul: substanta/manopera	Doza, Entitatea de masura	
C 71.0-C71.9 TUMORĂ MALIGNĂ A CREIERULUI						
C 71.0-C71.9 TUMORĂ MALIGNĂ A CREIERULUI	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei				
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Tab. Triampur compozitum *	p/o, 1 pe zi	
		Trimiterea la neurolog	1	Tab. Paracetamolum 500 mg	p/o. 1x2 ori/zi	
			II. Paraclinice			
	b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiei				
		Radiografia craniană	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi	
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi	
		Examene de laborator	1			
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiei				
			1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi	
CT cerebral nativ si cu contrast		1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x4 ori/zi		
IRM cerebral nativ si cu contrast		1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi		
Radiografia pulmonară		1	Tab. Carbamazepinum 400 mg	1x2 ori zi		
ECG		1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi		
Examen de laborator		1				
		Trimitere la neurochirug	1			
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei		Ceftazidimum 1 g	i/m 1,0X4 ori/zi	

			1	Metronidazolium 500 mg	1/v 3xzi
		IRMnativ si cu contrast	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
		CT cerebral (CT angio)	2	Sol. Metamizoli natrium 50% - 2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Consultatia internistului	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Consultatia oftalmologului	1	Sol. Amitriptylinum 1% - 2ml	i/m 2mlxzi
		Consultatia ORL	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		Consultatia oncologului	1	Sol. Etamsylatum 12,5% - 2ml	i/m. 2,0x3 ori/zi
		Consultația anesteziologului	1	Sol. Nadroparini calcium 0,3 ml seringă preumpluta	s/c 0,3 ml /zi
		Consultația reanimatologului	1	Sol. Kalii chloridum 4%- 10ml	i/v. 20 ml/zi
				Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2ml	i/v,i/m 2xzi
		II. Paraclinice		Sol. Magnesii sulfas 25% - 5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		Analiza generală a sangelui	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2ml	3x zi
		Sumarul urinei	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	400,0x2 ori/zi
		Glicemia	1	Tab. Paracetamolium 500 mg	peros 2 x zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 0,2% - 2ml	i/m. 2,0x1 1/zi
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Aminophyllinum 2,4% - 5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		Ureea	1	Sol. Gelofuzin (combinatie) 500 ml	i/v 1xzi
		Coagulograma	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% - 5ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Ionogramma	1	Sol. Furosemidum 1% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		MRS	1	Sol. Tramadolium 5%-2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Rx cutiei toracice	1	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps /zi
		Examen histologic	1	Sol. Mannitolium 15% - 500 ml	500 ml
		Monitoring electrofiziologic	1	Sol. Metilprednizolonum 500mg	i/v 30 mg/kcorp
		ECG	1	Sol. Ambroxolum 30mg	150 ml
				Sol. Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum) 500ml	500 ml
				Sol Reopoliglucini (Dextranum + Natrii chloridum) 500 ml	i/v

				Sol. Acidum ascorbicum 10 % - 5ml	5 ml x 2 ori
				Sol. Azametoniu bromid * 5% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
				Dren spinal	
				Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Povidoni iodidum	uz extern
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol.Viridum nitens 1%-10ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1%-100ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				pentru zonele elocvente	
				Operația: Ablația tumorii	
				Duroplast, Burete hemostatic, Bioclei	
				Anestezie totală cu VA	

CIM Entitatea nozologica	Etapă acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
C 72.0-C72.9 TUMORĂ MALIGNĂ A MĂDUVEI SPINĂRII, ANERVIILOR CRANIEINI ȘI ALTOR PĂRȚI A SNC					

C 72.0-C72.9
TUMORĂ MALIGNĂ A
MĂDUVEI SPINĂRII,
ANERVIILOR CRANIEINI
ȘI ALTOR PĂRȚI A SNC

a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei			
	Evaluarea neurologica a pacientului	1	Tab. Triampur compozitum *	i/m 1 xzi
	Trimiterea la neurolog	1	Tab. Paracetamolium 500 mg	i/m. 2,0x1 ori/zi
	II. Paraclinice		Tab. Indometacinum 100 mg	1X 2 ori pe zi
b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiei			
	Radiografia craniană	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
	Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m 4 xzi
	Exame de laborator	1	Sol. Diclofenacum 2,5% -3 ml	i/m 1xzi
c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiei			
		1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
	CT mielo	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
	IRM sinal nativ si cu contrast	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
	Radiografia pulmonară	1	Tab Carbamazepini 600 retrd	p/o X1 pe zi
	ECG	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi
	Examen de laborator	1		
	Trimitere la neurochirurg	1		

d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladei		Sol. Lincomycinum 30% -1ml	i/m. 2,0x3ori/zi
	Potențiale evocate	1	Vancomycinum 500 mg	i/v 2 x zi
	Monitoring electrofiziologic	1	Caps. Acidum pipemidicum 400 mg	2capsx2 ori/zi
	RMN spinal nativ si cu contrast	1	Sol. Tramadolium 5% – 2ml	i/m. 2,0/zi
	Consultatia internistului	1	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps/zi
	Consultatia ORL	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi
	Consultatia oncologului	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
	Consultația anesteziologului și reanimatologului	1	Sol. Neostigmini methylsulphas 0,05% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
	CT mielo	1	Sol. Aminophyllinum 2,4% - 5ml	i/v. Perfuzie 5,0x2 ori/zii
		1	Sol. Chloropyraminum 2% -1ml	i/m 1xzi
	II. Paraclinice	1	Sol Acidum nicotinicum 1% -1ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
	Analiza generală a sangelui	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
	Sumarul urinei	1		
	Glicemia	1	Sol. Nitrofuralem 0,02% -200ml	uz extern
	Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% - 5ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
	Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Methylprednisolonum 2,5% -1ml	i/v perfuzie
	Ureea	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% -1ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
	Coagulograma	1	Tab. Tizanidinum 4mg	peros 2xzi
	Ionogramma		Bisacodylum 10 mg	sup. rect 1xzi
	MRS	1	Seringi 20 ml	
	Rx cutiei toracice	1	Seringi 10 ml	
	ECG	1	Seringi 5 ml	
	Examen histologic	1	Seringi 2 ml	
	Analiza generala LCR	1	Sisteme perfuzie	
			Mănuși	

			Mușama medicinală	2 m
			Spiritus aethylicus 70%	
			Vată	
			Termometru	
			Emplastru	
			Dren spinal	
			Cateter Foleu	
			Sol. Dioxydinum 1% - 5ml	
			Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1%-100ml	uz extern
			Fașă	
			Tifon	
			Operația: Ablația tumorii, biopsia	
			Anestezie totală cu VA, NZA	

CIM Entitatea nozologica	Etapă acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
--------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------	---------------------------------	---------------------------

D 32.0-D32.9; D 33.0-D33.9 II. TUMORI BENIGNE ALE CREIERULUI ȘI ALTE PARTI ALE SNC

D 32 D 33 TUMORI BENIGNE ALE CREIERULUI ȘI ALTE PARTI ALE SNC	a) Urgență prespitalicească	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Tab. Triampur compozitum *	p/o 1 xzi
		Trimiterea la neurolog	1	Tab. Paracetamolium 500 mg	i/m. 2,0x1 ori/zi
		II. Paraclinice			
	b) Medicală primară	I. Clinice specifice maladiei			

		Radiografia craniană	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m 4 xzi
		Examene de laborator	1		
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiiei			
			1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		CT cerebral nativ + contrast	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x4 ori/zi
		IRM cerebral nativ + contrast	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Radiografia pulmonară	1	Tab. Carbamazepinum 400 mg	1x2 ori zi
		ECG	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei		Sol. Ciprofloxacinum 100 mg	1X3 ori/zi
			2	Meropinemum 2 mg	i/v 2xzi
		IRM nativ + contrast	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
		CT cerebral (CT angio)	2	Sol. Metamizoli natrium 50% - 2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Consultatia internistului	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Consultatia oftalmologului	2	Sol. Amitriptylinum 1% - 2ml	i/m 2mlxzi
		Consultatia ORL	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		Consultatia oncologului	1		

		Consultația anesteziologului	1	Sol. Nadroparini calcium 0,3 ml seringă preumplută	s/c 0,3 ml /zi
		Consultația reanimatologului	1	Sol. Kalii chloridum 4%- 10 ml	i/v. 20 ml/zi
			1	Sol. Ketoprofenum 100 mg -2 ml	i/m 2xzi
		II. Paraclinice		Sol. Magnesii sulfas 25% - 5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		Analiza generală a sangelui	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2ml	3x zi
		Sumarul urinei	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	400,0x2 ori/zi
		Glicemia	1	Tab. Paracetamolum 500 mg	peros 2 x zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 0,2% - 2ml	i/m. 2,0x1 1/zi
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Aminophyllinum 2,4% - 5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		Ureea	1	Sol. Gelofuzin (combinație) 500 ml	i/v 1xzi
		Coagulograma	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% - 5ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Ionogramma	1	Sol. Furosemidum 1% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		MRS	1	Sol. Tramadolum 5% -2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Rx cutiei toracice	1	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps /zi
		Examen histologic	1	Sol. Mannitolium 15% -500 ml	500 ml
		Monitoring electrofiziologic		Sol. Pexomet * 500 mg	i/v 30 mg/kcorp
		ECG	1	Sol. Ambroxolum 30mg	150 ml
				Sol. Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum) 500 ml	500 ml
				Sol Reopoliglucin (Dextranum + Natrii chloridum) 500 ml	i/v
				Sol. Acidum ascorbicum 10 % - 5ml	5 ml x 2 ori
				Sol. Azametoniū bromid * 5% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
				Bisacodylum 10 mg	per rectum
				Dren spinal	
				Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	

				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol.Viridum nitens 1% -10ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1% -100ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				pentru zonele elocvente	
				Operația: Ablația tumorii	
				Duroplast, Burete hemostatic, Bioclei	
				Anestezie totală cu VA	
CIM Entitatea nozologică	Etapă acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
G 06.0- G 06.2 ABSCEȘ SI GRANULOM INTRACRANIAN SI ARAHNAIDIAN					
G 06 G 07 VII. ABSCEȘ SI GRANULOM INTRACRANIAN SI ARAHNAIDIAN	a) Urgență prespitalicească	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Tab. Triampur compozitum *	p/o 1 xzi
		Trimiterea la neurolog	1	Tab. Tab. Paracetamolum 500 mg	i/m. 2,0x1 ori/zi
		II. Paraclinice			
	b) Medicală primară	I. Clinice specifice maladiei			
		Radiografia craniană	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi

		Examene de laborator			
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiiei		Sol. Furosemid 1% -2ml	i/m 1 xzi
			1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		CT cerebral nativ contrast	1	Sol. Ceftazidimum 1 g	i/m 1,0x4 ori/zi
		IRM cerebral nativ contrast	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Radiografia pulmonară	1		
		ECG	1		
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei		Sol. Imipinem doar în combinație: (Imipenemum +	i/v 1x2 ori/zi
		Echo-Eg	2	Metronidazolium 500 mg	i/v 3xzi
		IRM cerebral nativ contrast	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
		CT cerebral nativ contrast	2		
		Consultatia internistului	1	Sol. Metamizoli natrium 50% - 2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Consultatia oftalmologului	2	Sol. Difenhidramina 1% - 1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Consultatia ORL	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		Consultatia oncologului	1		
		Consultația anesteziologului	1	Sol. Nadroparini calcium 0,3 ml seringă preumpluta	s/c 0,3 ml /zi
		Consultația reanimatologului	1	Sol. Kalii chloridum 4%- 10 ml	i/v. 20 ml/zi
		Consultatia stomatologului	1	Sol. Ketoprofenum 100 mg -2 ml	i/m 2xzi
		II. Paraclinice			
		Analiza generală a sangelui	1		
		Examen bacteriologic	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	400,0x2 ori/zi
		Sumarul urinei	1	Tab. Paracetamolium 500 mg	peros 2 x zi
		Glicemia	1	Vancomycinum 500000 UN	2x zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 0,2% - 2ml	i/m. 2,0x1 1/zi
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Aminophyllinum 2,4% - 5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		Ureea	1	Sol. Hartman (combinație) 500 ml	i/v 1xzi

		Coagulograma	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% - 5ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Ionogramma	1	Sol. Furosemidum 1% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		MRS	1	Sol. Tramadolium 5%-2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Rx cutiei toracice	1	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps /zi
		Monitoring electrofiziologic	1	Sol. Mannitolium 15% - 500 ml	500 ml
		ECG	1		
				Sol. Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum) 500 ml	500 ml
				Sol. Clopidogrelum 1000 ml	i/v
				Sol. Acidum ascorbicum 10 % - 5ml	5 ml x 2 ori
				Bisacodylum 10 mg	per rectum
				Dren cerebral	
				Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Povidoni iodidum	uz extern
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Viridum nitens 1%-10ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Pentru zonele elocvente	
				Operația: Evacuarea abces,drenare	
				Duroplast, Burete hemostatic, Bioclei	
				Anestezie totală cu VA	

CIM Entitatea nozologica	Etapa acordarii asistentii medicale	Denumirea comuna internationala a investigatiilor	Numarul investigiilor	Tratamentul: substanta/manopera	Doza, Entitatea de masura
D 35.2 TUMORA BENIGNA A HIPOFIZEI					
D 35.2 TUMORĂ BENIGNĂ A HIPOFIZEI	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1		
		Trimiterea la neurolog	1		
		Testele hormonale sangvine	1		
		II. Paraclinice			
	b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiei			
Radiografia craniană		1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2ml	i/m. 2,0x1 ori/zi	
Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria		1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi	
Examene de laborator		1			
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiei			
Testele hormonale sangvine		1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi	
CT cerebral nativ contrast		1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi	
IRM cerebral nativ contrast		1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi	
Radiografia pulmonară		1			
ECG		1			
Examen de laborator		1			
Trimitere la neurochirurg		1			
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei	1		
Testele hormonale sangvine		2	Sol. Cefopirazonum 2 g	i/v 2,0X3 ori/zi	
IRM nativ contrast		1	Metronidazolium 500 mg	1/v 3xzi	

		CT cerebral (CT angio)	2	Tab. Nitroxolinum 50 mg	peros 2 x zi
		Consultatia internistului	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
		Consultatia oftalmologului	1	Sol. Metamizoli natrium 50% - 2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Consultatia ORL	1	Sol. Diphenhydraminum 1% 1,0	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Consultatia oncologului	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		Consultația anesteziologului	1	Sol. Hydrocortizon hemisuccinat 2ml	2mlx3 ori/zi
		Consultația reanimatologului	1	Sol. Nadroparini calcium 0,3 ml seringă preumpluta	s/c 0,3 ml /zi
		Consultatia endocrinologului	1	Sol. Kalii chloridum 4%- 10 ml	i/v. 20 ml/zi
		II. Paraclinice		Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/v,i/m 2xzi
		Analiza generală a sangelui	1	Sol. Magnesii sulfas 25% - 5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		Sumarul urinei	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2ml	3x zi
		Glicemia	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	400,0x2 ori/zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Tab. Paracetamolum 500 mg	peros 2 x zi
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 0,2% - 2ml	i/m. 2,0x1 1/zi
		Ureea	1	Sol. Aminophyllinum 2,4% - 5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		Coagulograma	1	Sol. Gelofuzin (combinație) 500 ml	i/v 1xzi
		Ionogramma	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% - 5ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		MRS	1	Sol. Furosemidum 1% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		Rx cutiei toracice	1	Sol. Tramadolium 5%-2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Examen histologic	1	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps /zi
		Monitoring electrofiziologic	1	Sol. Mannitolium 15% - 500 ml	500 ml
		ECG	1	Sol. Metilprednizolonum 500 mg	i/v 30 mg/kcorp
		Testele hormonale sangvine		Alprozolan 0.5	peros 2 x zi
				Sol. Ringher (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum) 500 ml	500 ml
				Sol Reopoliglucini (Dextranum + Natrii chloridum) 500 ml	i/v
				Sol. Acidum ascorbicum 10 % - 5ml	5 ml x 2 ori
				Desmopressinum 0,1 mg/ml nasal spray	puf nazal 2 ori/zi
				Dren spinal	

				Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Povidoni iodidum	uz extern
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Viridum nitens 1% -10ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Pentru zonele elocvente	
				Operația: Ablația tumorii	
				Duroplast, Burete hemostatic, Bioclei	
				Anestezie totală cu VA	

CIM Entitatea nozologica	Etapa acordarii asistentii medicale	Denumirea comuna internationala a investigatiilor	Numarul investigatiilor	Tratamentul: substanta/manopera	Doza, Entitatea de masura
G 20 BOALA PARKINSON					
G 20 BOALA PARKINSON	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1		
		Trimiterea la neurolog	1		
		II. Paraclinice			

	b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiiei			
		Radiografia craniană	1	Sol. Diazepamum 0,5%- 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1		
		Examene de laborator	1		
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiiei			
			1		
		CT cerebral nativ contrast	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		IRM cerebral	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Radiografia pulmonară	1		
		ECG	1		
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		EEG	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei		Ceftriaxonum 1 g	i/v 1,0X2 ori/zi
		RMN cerebral nativ + contrast	1	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps/zi
		CT cerebralnativ + contrast	2		
		II. Paraclinice		Sol. Pentoxifyllinum 2% - 5ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Analiza generală a sangelui	1		
		Sumarul urinei	1		
		EEG	1	Sol. Dextetoprofenum 2,5% - 2 ml	i/v 2,0X2 ori/zi
		Glicemia	1	Sol. Mannitolium 15% - 500 ml	500 ml
		Bilirubina (totala-direcra)	1	Comp. Nacom (Levodopum + Carbidopum)	per os
		Ureea	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 1 % - 2 ml	2 ml
		Coagulograma	1	Sol. Actovegin (combinatie) 10 ml	perfuzie
		Ionogramma	1	Seringi 20 ml	
		MRS	1	Seringi 10 ml	
		Rx cutiei toracice	1	Seringi 5 ml	
		ECG	1	Seringi 2 ml	
		Consultatia internistului	1	Sisteme perfuzie	

		Consultatia oftalmologului	1	Mănuși	
		Consultatia ORL	1	Mușama medicinală	2 m
		Consultatia oncologului	1	Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
		Consultația anesteziologului, consultația reamanitologului	1	Termometru	
		Consultatia ftiziointernistului	1	Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Viridum nitens 1% -10ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1%-100ml	uz extern
				Fașă 7x14 cm	
				Tifon (metri)	
				Operația: Criodestructia, implantarea electrozilor de stimulare.	
				Anestezie totală cu VA, NZA	
CIM Entitatea nozologica	Etapa acordarii asistentii medicale	Denumirea comuna internationala a investigatiilor	Numarul investigatiilor	Tratamentul: substanta/manopera	Doza, Entitatea de masura
G 50; G 51; G52; G 53 AFECTIUNILE NERVILOR CRANIENI					
G 50-53 AFECTIUNILE NERVILOR CRANIENI	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Caps. Diclofenacum 100 mg	p/o 1 tab / zi
		Trimiterea la neurolog	1	Tab. Carbamazepinum 400 mg	p/o 1 tab / zi
		II. Paraclinice			

	b) Medicală primară	I. Clinice specifice maladiei			
		Radiografia craniană	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Diclofenacum 2,5% - 2 ml	i/m 1 xzi
		Examene de laborator	1	Tab. Carbamazepinum 400mg	p/o 1px 2 zi
	c) Specializată de ambulator	I. Clinice specifice maladiei			
			1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		CT cerebral	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		IRM cerebralnativ+ contrast+ CISS	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Radiografia pulmonară	1	Tab. Carbamazepinum 400mg	1x2 ori zi
		ECG	1		
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		EEG	1		
		EMG, potențiale evocate	1		
	d) Spitalicească	I. Clinice specifice maladiei		Ceftriaxonum 1 g	i/v 1,0x3 ori/zi
		RMN cerebral, nativ contrast, + CISS secvente	1	Sol. Tramadolium 5%-2ml	i/m. 2,0/zi
		CT cerebral	2	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps la 3 zile
		EEG	1		
		EMG, potențiale evocate	1		
		II. Paraclinice		Sol. Natrii chloridum 0,9% -200ml	i/v. Perfuzie 200,0/zi
		Analiza generală a sangelui	2	Sol. Diphenhydraminum 1% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Sumarul urinei	1	Sol. Chloropyraminum 1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Glicemia	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Acum Nicotinicum 1% -1ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Bilirubina (totala-direcťa)	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/v

		Ureea	1	Sol. Lornoxicamum 8 mg	i/v
		Coagulograma	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Ionogramma	1	Sol. Ipidacrinum 1,5% -2 ml	i/m. 2 ml/zi
		MRS	1	Caps. Acidum pipemidicum 0,4	1 caps x 2 ori/zi
		Rx cutiei toracice	1	Sol. Neostigmini methylsulphas (Prozerini) 0,05% - 1 ml	s/c 1 xzi
		ECG	1	ATF 1,0	i/m 1xzi
		Monitorin electrofiziologic	1	Cocarnit 2 ml	i/m 2 ml 2xzi
		Examen anesteziolog și reanimatolog	1	Seringi 20 ml	
		Consultatia internistului	1	Seringi 10 ml	
		Consultatia ftiziointernistului	1	Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter venos	
				Cateter Foleu	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5ml	
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1% -100ml	uz extern
				Fașă 7x14 cm	
				Tifon (metri)	
				Operația: Neuroliza, decompresie, reurografie, plastia nervului.	
				Anestezie totală combinată cu VA, NZA	

CIM Entitatea nozologica	Etapă acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
G 60-G 64 NEUROPATII ALE MEMBRELOR SUPERIOARE SI INFERIOARE					
G 60-G 64 NEUROPATII ALE MEMBRELOR SUPERIOARE SI INFERIOARE	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Tab. Paracetamolum 500 mg	p/o, 1 tabx2 zi
		Trimiterea la neurolog	1		
		II. Paraclinice			
	b) Medicală primară	I. Clinice specifice maladiei			
		Radiografia membrilor superioare, inferioare	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		EMG	1		
		Examene de laborator	1		
	c) Specializată de ambulator	I. Clinice specifice maladiei			
		EMG	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Radiografia membrului afectat	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		IRM neurografia	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Potențiale evocate	1	Caps Neurobion (Thiamini hydrochloridum + Pyridoxinam)	p/o, 1 capsX2 zi
		ECG	1		

		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		Potențiale evocate	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei		Compr. Ciprofloxacinum 0,5	1 compr.x2 ori/zi
		Radiografia membrului afectat	1		
		Rx cutiei toracice	1	Caps. Fluconazolum 150 mg	1 caps/zi
		EMG		Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	i/v. Perfuzie 200,0/zi
		Potențiale evocate	1	Sol. Diclofenacum 2,5% -3 ml	i/m. 3,0/zi
		RMN neurografia	1	Sol. Neostigmini methylsulphas 0,05% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Consultatia internistului	1		
		Consultatia ftziointernistului	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% -2ml	i/m. 4mgx3 ori/zi
		II. Paraclinice		Sol. Lidocaini hydrochloridum 2% - 2ml	2ml x 5 anestezie locala
		Analiza generală a sangelui		Sol. Lornoxicamum 8 mg	i/v.
		Sumarul urinei		Sol. Ipidacrinum 1,5% -2 ml	i/m 1xzi
		Glicemia	1	ATF 1,0	i/m 1xzi
		Grupa de sange & Rh factor	1		
		Bilirubina (totală-directă)	1	Sol. Gentamicinum 4% -2ml	i/m 2xzi
		Ureea	1	Sol Benevron * 4 ml	i/m
		Coagulograma	1	Seringi 20 ml	
		Ionogramma	1	Seringi 5 ml	
		MRS	1	Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum)1% -100 ml	uz extern
				Fașă 7x14 cm	

				Tifon (metri)	
				Operația: Neuroliza, neuroplastia, neurorafia, transpoziția nervului.	
				Anestezie totală combinată cu VA, NZA	
CIM Entitatea nozologica	Etapa acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
G 91.0-G91.9; G 94.0-G94.1; G94.2 HIDROCEFALIE; G 93.0 CHIST CEREBRAL					
G 91.0-G91.9; G 94.0-G94.1; G94.2 HIDROCEFALIE; G 93.0 CHIST CEREBRAL	a) Urgența prespitalicească	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Tab. Triampur compozitum *	p/o 1 xzi
		Trimiterea la neurolog	1	Tab. Paracetamolium 500 mg	p/ox2ori/zi
		II. Paraclinice		Tab. Metoclopramidum 10 mg	p/o 1 xzi
	b) Medicală primară	I. Clinice specifice maladiei			
		Radiografia craniană	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Furosemidum 1%- 2ml	i/m 1 xzi
		Exame de laborator	1	Sol. Metoclopramidum 0,5% -2,0	i/m 1 xzi
	c) Specializată de ambulator	I. Clinice specifice maladiei			
		ECHO-Eg	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		CT cerebral	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		IRM cerebral nativ +contrast+ flow	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi

		Radiografia pulmonară	1		
		ECG	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		Puncția lombară	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei		Ceftriaxonum 1 g	i/m. 1,0x3 ori/zi
		Rx cutiei toracice	1	Ceftazidimum (Fortum) 2g	i/m 2,0x2 ori/zi
		ECG	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
		Consultatia oftalmologului	1	Sol. Metamizol 50% - 2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		IRM cu flow-metrie	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	i/m. 2,0/zi
		CT cerebral	2	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps/zi
		EEG (la convulsii)	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi
		Consultatia ORListului	2	Sol. Aminophyllinum 2,4% - 5 ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		Consultatia internistului	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
				Sol. Vinpocetinum 0,5% - 2 ml	i/v. Perfuzie 2,0/zi
		Consultația anesteziologului și reanimatologului	1	Sol. Cocarniti (combinație) 2 ml	i/m 1xzi
		II. Paraclinice		Sol. Pentoxifyllinum 2% - 5 ml	i/v 1xzi
		Analiza generală a sangelui	1	Sol. Piracetamum 3g/15ml	i/v 1xzi
		Sumarul urinei	1	Bisacodylum 10 mg	sup perrect 1xzi
		Glicemia	1	Sol. Chloropyraminum 2 ml	i/m 1xzi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Seringi 10 ml	
		Bilirubina (totala-directa)	1	Seringi 5 ml	
		Ureea	1	Seringi 2 ml	
		Coagulograma	1	Sisteme perfuzie	
		Ionogramma	1	Șunturi de diferite presiune	
		MRS	1	Mănuși	
		Examen LCR	1	Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	

				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1%-100ml	uz extern
				Fașă 7x14 cm	
				Tifon (metri)	
				Operația: Suntare VP, VJ	
				Drenaje lombare	
				Suntari Ventriculo-Peritoneale, Ventriculo-Jugulare, excisia chistului, drenarea chistului, chisto-cisternostomie.	
				Anestezie totală cu VA, NZA	

CIM Entitatea nozologica	Etapa acordarii asistentei medicale	Denumirea comuna internationala a investigatiilor	Numarul investigatiilor	Tratamentul: substanta/manopera	Doza, Entitatea de masura
G 95.0 ; G95.2; G 96.0 SIRINGOMIELIA SI SIRINGOBULBIA					
G 95.0 ; G95.2; G 96.0 SIRINGOMIELIA SI SIRINGOBULBIA	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1		
		Trimiterea la neurolog	1		
		II. Paraclinice			
	b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiei			
		Radiografia craniană	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi
		Examene de laborator	1		

	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiiei			
			1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		CT cerebral	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		IRM cerebral	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Radiografia pulmonară	1		
		ECG	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		Potențiale evocate	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei		Sol. Lincomycinum 30%-1 ml	i/m. 2,0x3ori/zi
		Potențiale evocate	1	Vancomycinum 500 mg	i/v 2 x zi
		Monitoring electrofiziologic	1	Caps. Acidum pipemidicum 400 mg	2capsx2 ori/zi
		RMN cerebral nativ contrast	1	Sol. Tramadolium 5% – 2 ml	i/m. 2,0/zi
		Consultatia internistului	1	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps/zi
		Consultatia ORL	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi
		Consultatia oncologului	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Consultația anesteziologului și reanimatologului	1	Sol. Neostigmini methylsulphas 0,05% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		II. Paraclinice	1	Sol. Aminophyllinum 2,4% - 5 ml	i/v. Perfuzie 5,0x2 ori/zii
		Analiza generală a sangelui	1	Sol. Chloropyraminum 1 ml	i/m 1xzi
		Sumarul urinei	1	Sol. Gentamicin 4% -2 ml	i/m 1xzi
		Glicemia	1	Sol. Metamazoli natrium 50% -2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Actovegin (combinatie) 10 ml	i/v 1 x zi
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Nitrofuralem 0,02% -200 ml	uz extern
		Ureea	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% - 5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi

		Coagulograma	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% -1ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
		Ionogramma		Sirdalud 4 mg	peros 2xzi
		MRS	1	Bisacodylum 10 mg	peros 1xzi
		Rx cutiei toracice	1	Seringi 20 ml	
		ECG	1	Seringi 10 ml	
				Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Dren spinal	
				Cateter Foleu	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5ml	
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1%-100ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Operația: Drenarea cavitatii siringomielice, decompresia fosei posterioare, laminectomie, șuntare ventriculoperitoneală.	
				Anestezie totală cu VA, NZA	

CIM Entitatea nozologică	Etapa acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
I 60.0-I 60.9; I 61.0-I 61.9; I 62.0-I 62.9 HEMORAGII INTRACEREBRALE NETRAUMATICE					

I 60.0-I 60.9; I 61.0-I 61.9; I 62.0-I 62.9 HEMORAGII INTRACEREBRALE NETRAUMATICE	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Sol. Furosemidum 1% - 2 ml	i/m 1 xzi
		Trimiterea la neurolog	1	Sol. Metamizoli natrium 50% - 2ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		II. Paraclinice		Sol. Magnesii sulfas 25% -5ml	i/v 5 ml
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1	Sol. Bendazolum (Dibazol) 1% - 1ml	i/m 6 ml
	b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiiei		Sol. Furosemidum 1% - 2 ml	i/m 1 xzi
		Radiografia craniană	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	i/v 5 ml
		Exame de laborator	1	Sol. Bendazolum (Dibazol) 1% - 1ml	i/m 6 ml
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiiei			
		Examenul neurologului	1	Sol. Furosemidum 1% - 2 ml	i/m 1 xzi
		CT cerebral nativ	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		CT angio cerebral	1	Sol. Etamsylatum 12,5% - 2ml	i/m. 2,0x3 ori/zi
				Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Radiografia pulmonară	1	Ceftriaxonum 1 g	i/m. 1,0 g x 4 ori/zi
		ECG	1		
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
Monitorizarea tensiunii arteriale		1			
d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei		Ceftriaxonum 1 g	i/m. 1,0 g x 4 ori/zi	
	CT cerebral nativ		Sol. Metronidazolum 500 mg	i/v 3xzi	
	CT angio cerebral	1	Caps. Fluconazolum 150 mg	1 caps/zi	
	RMN cerebral nativ+ contrast	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi	

		Anghiografia cerebrala conventionala		Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 2,0/zi
		Consultația anesteziologului și reanimatologului	2	Sol. Etamsylatum 12,5% - 2ml	i/m. 2,0x3 ori/zi
		Consultatia internistului	1	Sol. Kalii chloridum 4% -10ml	i/v. Perfuzie 30,0/zi
		Consultatia oftalmologului	2	Sol. Sol. Gelofuzin (combinație) 500 ml	i/v. Perfuzie 500,0/zi
		Consultatia ORL	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
				Sol. Natrii chloridum 0,9% -200ml	i/v. perfuzie 200,0x2 ori/zi
			1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
				Sol. Aminophyllinum 2,4%-5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		II. Paraclinice	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Analiza generală a sangelui	1	Compr. Nimodipinum 30 mg	2 compr.x2 ori/zi
		Sumarul urinei	1	Sol. Furosemidum 1% – 2ml	i/m. 2,0/zi
		Glicemia	1	Sol. Tramadolom 5%– 2ml	i/m. 2,0/zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Caps. Fluconazolom 150 mg	1 caps /zi
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Nimodipinum 0,02 % - 50ml	i/v. Perfuzie 50,0x2 ori/zi
		Ureea	1	Sol. Enalaprilum 1,25mg/1ml	i/v. Perfuzie 1,25mg/zi
		Coagulograma	1	Sol.Piracetam 3g/15ml	15,0x2 ori/zi
		Ionogramma	1	Sol. Iodonat (Iodum + Kalii iodidum)	uz extern
		MRS	1	Sol. Aprotininum 10000 UA	i/v. Perfuzie 10000 UA/zi
		Analiza la HIV	1	Sol. Panangin (Kalii aspartas + Magnesii aspartas) 10ml	i/v. 10,0x2 ori
		Examen LCR	1	Sol. Verapamilum 0,25% - 2ml	i/v. Perfuzie 2,0/zi
		Rx cutiei toracice	1	Sol. Mannitolom 15 % - 500 ml	i/v. Perfuzie 500,o/zi

		ECG	1	Sol. Papaverinum 2% - 2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
				Sol. Ipidacrinum 1,5% - 1ml	i/m 1 ml x 2ori
				Sol. Urapidilum 25 mg -5 ml	i/v 1xzi
				Sol. Bendazolium (Dibazol) 1% - 1ml	i/v 4 ml 2xzi
				Caps. Lansoprozolium 30 mg	1 cap x 3 ori
				Seringi 20 ml	
				Seringi 10 ml	
				Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5ml	
				Sol. Povidoni iodidum 1% -100 ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Operația: Evacuarea hematom; Trepanarea decompresivă, ventriculopuncție, puncție-aspirație cu fibrinoliza locală	
				Duroplast, Burete hemostatic, Bioclei	
				Anestezie totală cu VA, NZA	
CIM Entitatea nozologică	Etapă acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
M 43.8 DISCITA DISCULUI INTERVERTEBRAL					

M 43.8 DISCITA DISCULUI INTERVERTEBRAL	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Sol. Diclofenacum 2,5% -3ml	i/m 1 xzi
		Trimiterea la neurolog	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml - 2.0	i/m. 2,0x1 ori/zi
		II. Paraclinice		Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	
	b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiiei			
		Radiografia coloanei vertebrale	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
			1	Sol. Diclofenacum 2,5% -3ml	
		Examene de laborator	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m 2 ml
				Sol. Tramadolium 2ml	i/m 2 mlxzi
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiiei		Sol. Diclofenacum 2,5% -3 ml	i/m 1 xzi
		Examenul neurologului	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 2% -2 ml	blocade
		CT a coloanei vertebrale	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		IRM coloana vertebrală	1		
		Radiografia coloanei vertebrale	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Consultația fizioterapeutului	1	Sol Tramadolium 5% -2 ml	i/m 2 mlxzi
		ECG	1		
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		Consultația traumatologului	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei			
		RMN spinal nativ + contrast	1	Ceftriaxonum 1 g	i/v 1gx3 ori/zi
		Potențiale evocate	1	Vancomycinum 500 mg	i/v 3xzi
		Ex cont al tesut inlaturat	1	Sol. Gentamicinum 4% -2 ml	i/m 2ml x 1/zi
		Examen bacteriologic		Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps/zi la 2 zile

		Consultatia internistului	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi
		Consultatia urologului	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
			1	Sol. Neostigmini methylsulphas 0,05% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
			1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		II. Paraclinice	1	Sol. Diclofenacum 2,5% -3 ml	i/m 3ml x 1/zi
		Analiza generală a sangelui	1	Sol. Hydrogenii peroxydum 3% -400 ml	uz extern
		Sumarul urinei	1	Sol. Acidum nicotinicum 1% -2 ml	i/m. 2,0/zi
		Glicemia	1	Sol. Metamizoli natrium 50%- 2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Caps. Acidum pipemidicum 200 mg	1caps. 2ori/zi
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Meloxicamum 15 % - 1 ml	15 mg - 1 ml x 2 ori/zi
		Ureea	1	Tab. MIG 400 (Ibuprofenum)	1 tab x 2 ori
		Coagulograma	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/vx2ori
		Ionogramma	1	Caps. Omeprazolom 20 mg	peros 1xzi
		Examen LCR	1	Seringi 20 ml	
		Rx cutiei toracice	1	Seringi 10 ml	
		ECG	1	Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5 ml	
				Sol. Viridum nitens 1% -10 ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1% -100 ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Operația: Revizia spatiului intervertebral	
				Anestezie totală cu VA, NZA	

CIM Entitatea nozologica	Etapa acordarii asistentii medicale	Denumirea comuna internationala a investigatiilor	Numarul investigatiilor	Tratamentul: substanta/manopera	Doza, Entitatea de masura
M 50.0-M50.9 ATINGERI ALE DISCURILOR CERVICALE; M 51.0-M51.9 ATINGERI ALE DISCURILOR INTERVERTEBRALE SEGMENTUL TORACIC ȘI LOMBAR					
M 50.0-M50.9 ATINGERI ALE DISCURILOR CERVICALE; M 51.0-M51.9 ATINGERI ALE DISCURILOR INTERVERTEBRALE SEGMENTUL TORACIC ȘI LOMBAR	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Caps. Diclofenacum 100 mg	i/m 1 xzi
		Trimiterea la neurolog	1	Tab. Tolperisonum 150 mg	p/o ipx3 ori/zi
		II. Paraclinice			
	b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiei		Sol. Diclofenacum 2,5% - 3 ml	
		Radiografia coloanei vertebrale	1	Sol. Tolperisonum 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examene de laborator	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/m2 ml
				Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	i/m, 2,0x 2 zi
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiei		Sol. Diclofenacum 2,5% -3 ml	i/m 1 xzi
		Examenul neurologului	1	Sol. Tolperisonum 2 ml	i/m, 2,0x 2 zi
		Radiografia coloanei vertebrale cu	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Examen EMG	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		CT a coloanei vertebrale	1	Sol. Tramadolium 5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		IRM coloana vertebrală	1	Sol.Procainum (Novocaini) 0,5%- 5 ml	blocade
		Consultația fizioterapeutului	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml	blocade

		Examen de laborator	1	Sol. Diprospan (Betamethasoni natrii phosphas + Betamethasoni dipropionas) 2 ml	blocade
		Trimitere la neurochirurg	1		
			1		
		Consultația traumatologului	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei			
		Radiografia coloanei vertebrale cu	1	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps/zi la 3 zile
		Examen EMG	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi
		CT a coloanei vertebrale	2	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		CT mielo, CT discografie	1		
		Discografie provocatorie	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Potențiale evocate	1		
		IRM coloana vertebrală	1	Sol. Tenoxicamum 20 mg	i/m 20 mgxzi
			1	Sol. Methylprednisolonum 2,5-3,0	perfuzie x zi
			1		
		II. Paraclinice	1	Sol. Metamizoli natrium 50%- 2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Analiza generală a sangelui	1		
		Sumarul urinei	1	Caps. Acidum pipemidicum 200 mg	2 caps. x2ori/zi
		Glicemia	1	Sup. Bisacodylum 10 mg	per rectum
		Grupa de sange & Rh factor	1	Tab. Paracetamolium 500 mg	peros 1x2 zi
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Viridum nitens 1%-10ml	uz extern
		Ureea	1	Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1%-100 ml	uz extern
		Coagulograma	1		
		Ionogramma	1	Sol. Papaverinum 2% - 2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Examen LCR	1		
		Rx cutiei toracice	1	Seringi 20 ml	
		EMG	1	Seringi 10 ml	
				Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	

				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5 ml	
				Sol. Viridum nitens 1%-10 ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1% -100 ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Operația: Discectomia	
				Cage, Plastine fixatoare, Biopolimere	
				Anestezie totală cu VA, NZA	

CIM Entitatea nozologica	Etapa acordarii asistentii medicale	Denumirea comuna internationala a investigatiilor	Numarul investigatiilor	Tratamentul: substanta/manopera	Doza, Entitatea de masura	
I 63.0-I 63.9 INFARCTUL CEREBRAL						
I 63.0-I 63.9 INFARCTUL CEREBRAL	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei				
		Evaluarea neurologică a pacientului	1			
		Trimiterea la neurolog	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi	
		II. Paraclinice		Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	i/v 5 ml	
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1	Sol. Bendazolom (Dibazol) 1% - 1ml	i/m 6 ml	
	b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiiei			Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi
		Radiografia craniană	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi	
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	i/v 5 ml	

		Examen de laborator	1	Sol. Bendazolium (Dibazol) 1% - 1 ml	i/m 6 ml
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladii			
		Examenul neurologului	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi
		CT cerebral nativ	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		CT cerebral (CT angio)	1		
		IRM cerebral nativ + contrast +dif	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Angiografie cerebrala convention	1	Ceftriaxonum 1 g	i/m. 1,0 g x 4 ori/zi
		Dopplerografia duplex a vaselor b	1		
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladii			
		CT cerebral nativ	1	Ceftriaxonum 1 g	i/v 1gx2 ori/zi
		CT cerebral (CT angio)	####	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		IRM cerebral nativ + contrast +difuzia cerbrala	1	Sol. Diazepamumum 0,5% - 2 ml	i/m. 2,0/zi
		Angiografie cerebrala convention	1	Sol. Kalii chloridum 4% -10 ml	i/v. Perfuzie 30,0/zi
		ECG		Sol. Nimodipinum 50 ml	perfuzie
		II. Paraclinice	1		
		Analiza generală a sangelui	1	Sol. Reopoligliukin (Dextranum + Natrii chloridum) 500 ml	i/v. 500,0/zi
		Sumarul urinei	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
		Glicemia	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Natrii chloridum 0,9%-5 ml	i/v. 5,0/zi
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Ureea	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Coagulograma	1	Sol. Furosemidum 1% – 2 ml	i/m. 2,0/zi
		Ionogramma	1	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps/zi
		Examen LCR	1	Sol. Piracetamum 20% -10 ml	i/v. 10,0x2 ori/zi
		Rx cutiei toracice	1	Sol. Viridum nitens 1% -10 ml	uz extern
		ECG	1	Nadroparini calcium (Fraxiparin 0,3)	2xzi

		Dopplerografia duplex a vaselor brahiocefalice	1	Panangin (Kalii aspartas + Magnesii aspartas) 10ml	i/v. 10,0x2 ori/zi
		Dopplerografia transcraniană	1	Sol. Verapamilum 2,5% - 2 ml	i/v. Perfuzie 2,0/zi
				Sol. Papaverinum 2% - 2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
				Sol. Actovegin (combinație) 10 ml	perfuzie
				Caps. Lansoprozolum 30 mg	1 caps x 3 ori
				Sol. Mannitolum 15 % - 500 ml	i/v. Perfuzie 500,o/zi
				Seringi 20 ml	
				Seringi 10 ml	
				Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Ace puncție lombară	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5ml	
				Sol. Viridum nitens 1%-10ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1%-100 ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Operația: Craniotomie decompresiva largita, trombectomie.	
				Anestezie totală cu VA, NZA	

CIM Entitatea nozologica	Etapă acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
I 65.0-I 65.9; I 66.0-I 66.9 OCLUZIA ȘI STENOZA ARTERIILOR PRECEREBRALE ȘI CEREBRALE					
I 65.0-I 65.9; I 66.0-I 66.9 OCLUZIA ȘI STENOZA ARTERIILOR PRECEREBRALE ȘI CEREBRALE	a) Urgența prespitalicească	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Tab. Paracetamolum 500 mg	p/o 1 p x 2 zi
		Trimiterea la neurolog	1	Tab Acidum acetylsalicylicum 0,3	p/o 1 p x 1 zi
		II. Paraclinice		Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	i/v 5 ml
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1	Sol. Bendazolium (Dibalol) 1% - 1ml	i/m 6 ml
	b) Medicală primară	I. Clinice specifice maladiei		Sol. Furosemidum 1% -2 ml	i/m 1 xzi
		Examen de laborator	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
				Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	i/v 5 ml
				Sol. Dibalol (Bendazolium) 1% -1 ml	i/m 6 ml
	c) Specializată de ambulator	I. Clinice specifice maladiei			
		Examenul neurologului	1	Sol. Furosemidum 1% - 2 ml	i/m 1 xzi
		Dopplerografia/Duplex vasele brahioceflice	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		CT cerebral nativ	1		
		EKG	1		i/m. 2,0x1 ori/zi
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1	Ceftriaxonum 1 g	i/m. 1,0 g x 4 ori/zi
		Rx cutiei toracice	1		

	Examen de laborator(lipidograma, coagulograma)	1		
	Trimitere la neurochirurg	1		
d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei		Ceftriaxonum 1 g	i/v 1gx2 ori/zi
	Dopplerografia duplex a vaselor brahiocefalice	1	Sol. Acidum ascorbicum 10% -5 ml	i/v
	Dopplerografia transcraniană	1	Sol. Acidum thiocticum 600 mg -12 ml	i/v
	CT cerebral nativ	1	Sol. Citicolinum 1000 mg -4 ml	i/v
	CT Angio cerebral inclusiv trunchi	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
	Angiografie cerebrala conventionala	1	Sol. Diazepamumum 0,5% - 2 ml	i/m. 2,0/zi
	IRM cerebral nativ + contrast	1		
	Consultatia chinetoterapeutului	1	Sol. Kalii chloridum 4% -10 ml	i/v. Perfuzie 30,0/zi
	Consultatia internistului	1	Nadroparini calcium (Sol. Fraxiparin 0,3)	s/c 2 ori/zi
	II. Paraclinice	1	Sol. Dextranum 40 - 400 ml	i/v. 400,0/zi
	Analiza generală a sangelui	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	i/v. 5,0x2 ori/zi
	Sumarul urinei	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi
	Glicemia	3	Sol. Natrii chloridum 0,9% -5 ml	i/v. 5,0/zi
	Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
	Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
	Ureea	1	Sol. Furosemidum 1% – 2 ml	i/m. 2,0/zi
	Coagulograma	5	Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps/zi
	Ionogramma	1	Sol. Piracetamum 20% -10ml	i/v. 10,0x2 ori/zi
	CT angiografia vaselor brahiocefalice	1	Sol. Viridum nitens 1%-10 ml	uz extern
	Rx cutiei toracice	1	Sol Metronidazolium 500 mg	i/v 3xzi
	ECG	1	Panangin (Kalii aspartas + Magnesii aspartas) 10ml	i/v. 10,0x2 ori/zi
	CT perfuzia cerebrală	2	Sol. Verapamilum 2,5% - 2 ml	i/v. Perfuzie 2,0/zi

	RMN cerebrală cu contrast în regim de perfuzie cerebrală	1	Sol. Papaverinum 2% - 2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
			Sol. Drotaverinum 2% - 2 ml	i/m 2xzi
			Caps. Lansoprozolom 30 mg	1 caps x 3 ori
			Sol. Mannitolum 15 % - 500 ml	i/v. Perfuzie 500,o/zi
			Seringi 20 ml	
			Seringi 10 ml	
			Seringi 5 ml	
			Seringi 2 ml	
			Sisteme perfuzie	
			Mănuși	
			Mușama medicinală	2 m
			Spiritus aethylicus 70%	
			Vată	
			Termometru	
			Emplastru	
			Cateter Foleu	
			Sol. Dioxydinum 1% - 5 ml	
			Sol. Viridum nitens 1%-10 ml	uz extern
			Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1% -100 ml	uz extern
			Fașă	
			Tifon	
			Reconstrucție de ACI in deformarile patologice ale ACI	
			Trombectomie din ACI	
			Operația: Endarterectomia clasica cu reconstrucție de ACI	
			Protezare de ACI si ACC	
			Endarterectomie de artere vertebrale	
			Operația: Endarterectomia eversivă	
			By pass extra- intracranian	
			Operația: Endarterectomie clasică	

				Anestezie totală cu VA, NZA	
CIM Entitatea nozologica	Etapă acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
M 43.6 TORTICOLIS					
M 43.6 TORTICOLIS	a) Urgența prespitalicească	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Tab. Diazepamum 20 mg	p/o 1tx1 ori/zi
		Trimiterea la neurolog	1	Tab. Tolperisonum (Midocalm) 150 mg	p/o 1tx2 ori/zi
		II. Paraclinice			
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1		
	b) Medicală primară	I. Clinice specifice maladiei			
		Radiografia craniană	1		
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	i/v 5 ml
		Exame de laborator	1	Sol. Tolperisonum (Midocalm) 2ml	i/m 2 ml
		EMG și potențiale evocate	1		
	c) Specializată de ambulator	I. Clinice specifice maladiei			
		Examenul neurologului	1		
		ECHO-Eg	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		CT cerebral nativ+ contrast	1		
			1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Radiografia pulmonară	1		
		EKG	1	Sol. Tolperisonum (Midocalm) 2ml	i/m 2 ml
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1		

	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladii		Caps. Fluconazolium 150 mg	1 caps/zi
		IRM cerebral nativ+ contrast	1	Ceftriaxonum 1 g	i/v 1,0x4 ori/zi
		Consultatia internistului	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/v 2 ml x zi
		Consultatia fiziointernistului	1	Tab. Tizanidinum 4 mg	peros 1x2 zi
		II. Paraclinice		Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Monitoring electrofiziologic		Sol. Pentoxifyllinum 2% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Analiza generală a sangelui	1		
		Sumarul urinei	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Glicemia	1	Sol. Ketorolacum 30 mg	i/m 1x2 zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Seringi 20 ml	
		Bilirubina (totala-directa)	1	Seringi 10 ml	
		Ureea	1	Seringi 5 ml	
		Coagulograma	1	Seringi 2 ml	
		Ionogramma	1	Sisteme perfuzie	
		Examen LCR	1	Mănuși	
		Rx cutiei toracice	1	Mușama medicinală	2 m
		ECG	1	Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5 ml	
				Sol. Viridum nitens 1%-10 ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1% -100 ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Operația: Rizotomia selectiva	
				Anestezie totală cu VA, NZA	

CIM Entitatea nozologica	Etapa acordarii asistentii medicale	Denumirea comuna internationala a investigatiilor	Numarul investigatiilor	Tratamentul: substanta/manopera	Doza, Entitatea de masura	
Q 00.0-Q 09.9 Malformatii ale maduvei spinale						
Q 00.0-Q 09.9 Malformatii ale maduvei spinale	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei				
		Evaluarea neurologică a pacientului	1			
		Trimiterea la neurolog	1			
		II. Paraclinice				
			Monitorizarea tensiunii arteriale	1		
		b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiei			
			Radiografia coloanei vertebralei	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
			Examen EMG	1		
			Examene de laborator	1		
		c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiei			
	Examenul neurologului		1			
	Examen EMG		1			
	CT coloanei		1			
	IRM madivei spinarii		1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi	
	Radiografia pulmonară		1			
	ECG		1			
	Examen de laborator		1			
		Trimitere la neurochirurg	1			
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1			
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei		Sol. Lincomycinum 30%-1 ml	i/m. 2,0x3ori/zi	

	Potențiale evocate	1	Vancomycinum 500 mg	i/v 2 x zi
	Monitoring electrofiziologic	1	Caps. Acidum pipemidicum 400 mg	2capsx2 ori/zi
	RMN coloana nativ si cu contrast	1	Sol. Tramadolom 5% – 2ml	i/m. 2,0/zi
	Consultatia internistului	1	Caps. Fluconazolom 150 mg	1 caps/zi
	Consultatia ORL	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi
	Consultatia oncologului	1	Sol. Ipidacrinum 2 ml	i/m 2xzi
	Consultația anesteziologului și reanimatologului	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
	II. Paraclinice	1	Sol. Neostigmini methylsulphas 0,05% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
	Analiza generală a sangelui	1	Sol. Aminophyllinum 2,4% - 5ml	i/v. Perfuzie 5,0x2 ori/zii
	Sumarul urinei	1	Sol. Chloropyraminum 1 ml	i/m 1xzi
	Glicemia	1	Sol Acidum nicotinicum 1% -1 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
	Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
	Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Actovegin (combinație) 10 ml	i/v 1 x zi
	Ureea	1	Sol. Nitrofuralem 0,02% -200 ml	uz extern
	Coagulograma	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% - 5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
	Ionogramma		Sol. Dexamethasonum 0,4% -1 ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
	MRS	1	Sirdalud 4 mg	peros 2xzi
	Rx cutiei toracice	1	Bisacodylum 10 mg	sup perrect 1xzi
	ECG	1	Seringi 20 ml	
			Seringi 10 ml	
			Seringi 5 ml	
			Seringi 2 ml	
			Sisteme perfuzie	
			Mănuși	
			Mușama medicinală	2 m
			Spiritus aethylicus 70%	
			Vată	
			Termometru	
			Emplastru	

				Dren spinal	
				Ace puncție lombară	
				Cateter Foleu	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5 ml	
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1% -100 ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Operația: Ablația malformației, operații reconstructive.	
				Anestezie totală cu VA, NZA	

CIM Entitatea nozologică	Etapa acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
G 40 EPILEPSIA					
G 40 EPILEPSIA	a) Urgența prespitalicească	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Tab. Carbamazepinum 400 mg	1 caps x 2 ori
		Trimiterea la neurolog	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	2,0 x 1zi
		II. Paraclinice			
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1		
	b) Medicală primară	I. Clinice specifice maladiei			
		Radiografia craniană	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	2,0 x 1zi
		Examenul fundului de ochi, acuitatea vizuală, perimetria	1		
		Examene de laborator	1		

	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiei			
		Examenul neurologului	1	Tab. Triampur compositum *	per os 1xzi
		ECHO-Eg	1	Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		CT cerebral (CT angio)	1		
		IRM cerebral	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Radiografia pulmonară	1	Finlipsin retard 600 mg	per os 1xzi
		ECG	1		
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei		Tab. Carbamazepinum 400 mg	1 caps x 2 ori
		MRS	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	2,0 x 1zi
		RX cutiei toracice	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		ECG	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		II. Paraclinice	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Analiza generală a sangelui	1	Metronidazolium 500 mg	1 fl 3xzi
		Sumarul urinei	1	Caps. Ambroxoum 30 mg /150 mg	1 caps x 2 ori
		Glicemia	1	Sol. Mannitolium 15 % - 500 ml	i/v. Perfuzie 500,o/zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Seringi 20 ml	
		Bilirubina (totala-directa)	1	Seringi 10 ml	
		Ureea	1	Seringi 5 ml	
		Coagulograma	1	Seringi 2 ml	
		Ionogramma	1	Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5ml	

				Sol. Viridum nitens 1%-10ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1% -100 ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Operația: Stereotaxia, amigdalotomie.	
				Anestezie totală cu VA, NZA	
CIM Entitatea nozologica	Etapa acordarii asistentei medicale	Denumirea comuna internationala a investigatiilor	Numarul investigatiilor	Tratamentul: substanta/manopera	Doza, Entitatea de masura
S 00.0 - S 09.9 LEZIUNI TRAUMATICE ALE CAPULUI					
S 00.0 - S 09.9 LEZIUNI TRAUMATICE ALE CAPULUI	a) Urgenta prespitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Sol. Diclofenacum 2,5% -3 ml	i/m 1 xzi
		Trimiterea la neurolog	1	Tab. Triampur compositum *	
		II. Paraclinice		Sol. Tramadolim 2 ml	i/m 1 xzi
	b) Medicala primara	I. Clinice specifice maladiiei			
		Radiografia craniului	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% -2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examene de laborator	1	Tab. Triampur compositum *	
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiiei		Sol. Diclofenacum 2,5% -3 ml	i/m 1 xzi
		Examenul neurologului	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 2% - 2 ml	blocade
		Radiografia craniului	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		CT cerebral nativ	1		
		Radiografia coloanei vertebrale	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
			1	Sol. Tramadolium 5% - 2 ml	i/m 2 mlxzi
		ECG	1		
		Examen de laborator	1		

		Trimitere la neurochirurg	1		
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1		
		Consultația traumatologului	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiei			
		CT cerebral		Sol. Tramadolom 5% -2 ml	i/m. 2,0/zi
		RMN cerebral	1	Tab. Triampur compositum *	
		RX cutiei toracice	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		ECG	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Consultatia internistului	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	
		Consultatia oftalmogului	2	Ceftriaxonum 1 g	i/m. 1,0x4 ori/zi
		Consultatia ORL	1	Caps. Acidum pipemidicum 0,4	2 comp x 2 ori/zi
			1	Caps. Ketoconazolom 150 mg	1 comp x 4 ori/zi
		Consultatia anesteziolog/reanimator	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi x 2 ori
			2	Sol. Gelofuzin (combi-nație) 500 ml	perfuzie
			1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
			2	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		II. Paraclinice	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Analiza generală a sangelui	1	Sol. Piracetamum 3 g/15 ml	i/v 3,0x2 ori/zi
		Sumarul urinei	1	Hydrogenii peroxydum 3% - 400 ml	uz extern
		Glicemia	1	Sol. Viridum nitens 1%-10ml	uz extern
		Grupa de sange & Rh factor	1	Ung. Levomicol (Chloramphenicolum + Methyluracilum) 40 g	uz extern
		Bilirubina (totala-directa)	1	Seringi 20 ml	
		Ureea	1	Seringi 10 ml	
		Coagulograma	1	Seringi 5 ml	
		Ionogramma	1	Seringi 2 ml	
		Examen LCR	1	Sisteme perfuzie	
		Rx cutiei toracice	1	Mănuși	
		ECG	1	Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	

		Radiografia coloanei vertebrale	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Examene de laborator	1	Sol. Dibazol (Bendazolium) 1% - 1ml	i/m 6 ml
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladii		Sol. Diclofenacum 2,5% -3ml	i/m 1 xzi
		Examenul neurologului	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 2% -2 ml	blocade
		CT a coloanei vertebrale	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		IRM coloana vertebrală	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% -1 ml	blocade
		Radiografia coloanei vertebrale	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		Consultația fizioterapeutului	1	Sol Tramadolium 5% -2 ml	i/m 2 mlxzi
		ECG	1		
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1		
		Consultația traumatologului	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladii		Sol. Lincomycinum 30%-1ml	i/m 1x3 zi
		CT a coloanei vertebrale		Sol. Tramadolium 5%– 2ml	i/m. 2,0/zi
		IRM coloana vertebrală	1	Sol. Methylprednisolonum 500 mg	i/v 1000 mg /zi 3 zile
		RX cutiei toracice	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		ECG	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Consultatia internistului	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% -1 ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
		Consultatia oftalmogului	1	Vancomycinum 500 mg	i/m. 0,5x2 ori/zi
		Consultatia ORL	1	Caps. Acidum pipemidicum 0,4	2 comp x 2 ori/zi
		Consultatia stomatologului	1	Caps. Ketoconazoum 200 mg	1 comp x 1 ori/zi
		Consultatia urologului	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi x 2 ori
		Consultatia anesteziolog/reanimatolog	1	Bisacodylum 10 mg	per rectum 2xzi
			1	Tab. Famotidinum 20 mg	i/v 2xzi

		Discografie provocatoare	1	Chloropyraminum (Sol. Chloropyraminum 2 ml)	i/m 1xzi
		Potențiale evocate	1	Tab. Tizanidinum (Sol. Sirdalud) 4 mg	peros 2/zi
		RMN	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		CT mielo, CT discografie	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		II. Paraclinice	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Analiza generală a sangelui	1	Sol. Neostigmini methylsulphas 0,05% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Sumarul urinei	1	Hydrogenii peroxydum 3% - 400 ml	uz extern
		Glicemia	1	Methylprednisoloni acetat (Sol. Metipred) 2,0-3,0	perfuzie
		Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Viridum nitens 1% -10 ml	uz extern
		Bilirubina (totala-directa)	1	Ung. Levomicol (Chloramphenicolum + Methyluracilum) 40 g	uz extern
		Ureea	1	Seringi 20 ml	
		Coagulograma	1	Seringi 10 ml	
		Ionogramma	1	Seringi 5 ml	
		Examen LCR	1	Seringi 2 ml	
		Rx cutiei toracice	1	Sisteme perfuzie	
		ECG	1	Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Ace puncție lombară	
				Cateter Foleu	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5 ml	
				Sol. Viridum nitens 1%-10 ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1% -100 ml	uz extern
				Fașă	

				Tifon	
				Masaj	
				Electroforeză	
				Electrostimulare	
				Operația: Laminectomia decompresiva, corporodeza	
				Sisteme de fixare transpediculara, Cage, BAM (Cervicostate)	
				Anestezie totală cu VA, NZA	
CIM Entitatea nozologica	Etapă acordării asistenței medicale	Denumirea comună internațională a investigațiilor	Numărul investigațiilor	Tratamentul: substanța/manopera	Doza, Entitatea de măsură
M 48.0; M 48.5 SPONDILOPATII; M 43.0; M43.3; M43.5 DORSOPATHII DEFORMANTE					
M 48.0; M 48.5 SPONDILOPATII; M 43.0; M43.3; M43.5 DORSOPATHII DEFORMANTE	a) Urgență prespitalicească	I. Clinice specifice maladiei			
		Evaluarea neurologică a pacientului	1	Sol. Diclofenacum 2,5% -3 ml	i/m 1 xzi
		Trimiterea la neurolog	1	Sol. Tolperisonum (Midocalm) - 2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		II. Paraclinice			
	b) Medicală primară	I. Clinice specifice maladiei			
		Radiografia coloanei vertebrale	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi

		Examene de laborator	1		
	c) Specializata de ambulator	I. Clinice specifice maladiiei		Sol. Diclofenacum 2,5% -3 ml	i/m 1 xzi
		Examenul neurologului	1	Sol. Lidocaini hydrochloridum 2% -2 ml	blocade
		CT a coloanei vertebrale	1	Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		IRM coloana vertebrală	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% - 1 ml	blocade
		Radiografia coloanei vertebrale	1	Sol. Dexketoprofenum 2,5% - 2 ml	i/m. 2,0x1 ori/zi
		EMG	1	Sol. Tramadolium 2 ml	i/m 2 mlxzi
		ECG	1		
		Examen de laborator	1		
		Trimitere la neurochirurg	1		
		Monitorizarea tensiunii arteriale	1		
		Consultația traumatologului	1		
	d) Spitaliceasca	I. Clinice specifice maladiiei		Sol. Lincomycinum 30%-1ml	i/m 1x3 zi
		IRM coloana vertebrală	1	Fortum 2,0	i/v 2xzi
		RX cutiei toracice	1	Sol Gentamicini 4% -2 ml	i/m 2xzi
		EMG	1	Sol. Tramadolium 5%– 2 ml	i/m. 2,0/zi
		Discografie provocatoare	1	Sol. Gelofuzin (combinație) 500 ml	perfuzie
		Potențiale evocate	1	Sol. Lornoxicamum 8 mg	i/vxzi
		IRM coloana vertebrală	1	Sol. Methylprednisolonum 500 mg	i/v 1000 mg /zi 3 zile
		CT mielo, CT discografie	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	i/m. 2,0x2 ori/zi
		Consultatia internistului	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
			1	Sol. Dexamethasonum 0,4%-1 ml	i/m. 1,0x3 ori/zi
		Consultatia ORL	1	Vancomycinum 500	i/m. 0,5x2 ori/zi
			1	Caps. Acidum pipemidicum 0,4	2 comp x 2 ori/zi
		Consultatia urologului	1	Caps. Ketoconazoum 200 mg	1 caps x 1 ori/zi
		Consultatia anesteziolog/reanimatolog	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -400 ml	i/v. Perfuzie 400,0/zi x 2 ori
		II. Paraclinice		Bisacodylum 10 mg	per rectum 2xzi
		Analiza generală a sangelui	1	Tab. Famotidinum 20 mg	i/v 2xzi

		Sumarul urinei	1	Sol. Chloropyraminum 2 ml	i/m 1xzi
		Glicemia	1	Sol. Tizanidinum (Serdalud) 4 mg	peros 2/zi
		Grupa de sange & Rh factor	1	Sol. Piracetamum 3g/15 ml	i/v 15mlxzi
		Bilirubina (totala-directa)	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Ureea	1	Sol. Pentoxifyllinum 2% -5 ml	i/v. Perfuzie 5,0/zi
		Coagulograma	1	Sol. Neostigmini methylsulphas 0,05% -1ml	i/m. 1,0x2 ori/zi
		Ionogramma	1	Hydrogenii peroxydum 3% - 400 ml	uz extern
		Examen LCR	1	Tab. Paracetamolium 500 mg	per os 1x2 zi
		Rx cutiei toracice	1	Sol. Viridum nitens 1% -10 ml	uz extern
		ECG	1	Ung. Levomicol (Chloramphenicolum + Methyluracilum) 40 g	uz extern
				Seringi 20 ml	
				Seringi 10 ml	
				Seringi 5 ml	
				Seringi 2 ml	
				Sisteme perfuzie	
				Mănuși	
				Mușama medicinală	2 m
				Spiritus aethylicus 70%	
				Vată	
				Termometru	
				Emplastru	
				Cateter Foleu	
				Sol. Dioxydinum 1% - 5 ml	
				Sol. Viridum nitens 1%-10 ml	uz extern
				Sol. Betadin (Povidoni iodidum) 1%-100 ml	uz extern
				Fașă	
				Tifon	
				Masaj	
				Electroforeză	
				Electrostimulare	

				Operația: Laminectomia decompresiva, corporodeza	
				Sisteme de fixare transpediculara, Cage, BAM (Cervicostate), Vertebroplastii	
				Anestezie totală cu VA, NZA	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacioane	Durata tratamentului recomandat (zile)
1 tab	
1 tab	
1 f	
1 f	
1 f	
4 f	
2f	

2tab	
1 f	
16 fl	
15 flacoane	
30 f	
10 f	
10 f	
24 f	
5 buc	
10 f	
20 tab	
10 fl	
10 fl	
10 fiole	
10 f	
10 f	
10 f	
10 f	
5 f	

3 caps	
5 fl	
5 fl	
1 fl	
6 fl	
10 f	
10 f	
1	
60 buc	
40 buc	
15 buc	
20 perechi	
1 buc	
170ml	
100 ml	
140gr	
1 buc	
5 buc	
2 buc	
3 fl	
3 fl	
6 buc	
10 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoa ne	Durata tratamentu lui recomanda t (zile)
1 tab	
1 tab	
1 f	
1 f	
1 f	
4 f	
4f	
2p	
1 f	
16 fl	

15 fl	
20 f	
10 f	
10 f	
10 fiole	
10 f	
15 f	
5 buc	
10 f	
10 amp	
10 fl	
15 fl.	
10 fl	
10 pst	
5 f	
10 f	
3 f	
10 f	
5 f	
10 f	
3 caps	
4 fl	
5 fl	
1 fl	
6 fl	
3 fl	

10 f	
10 f	
1	
60 buc	
40 buc	
10 buc	
20 perechi	
1 buc	
170ml	
100 ml	
140gr	
1 buc	
5 buc	
1 buc	
3 fl	
3 fl	
6 buc	
10 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoa ne	Durata tratamentu lui recomanda t (zile)

1 f	
1 f	
2tab	
1 f	
4 f	
1f	
1 f	
6 f	
6f	
7 tab	
1 f	

15 f	
10 fiole	
20 caps	
5 f	
2 caps	
10 fl	
10 f	
10 f	
10 f	
10 fiole	
20 f	
10 f	
2 fl	
5 f	
10 f	
15 f	
10 pastile	
5 sup	
5 buc	
20 buc	
20 buc	
20 buc	
10 buc	
10 perechi	

1 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
10 f	
3 fl	
10 buc	
15 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoane	Durata tratamentului recomandat (zile)
1 tab	
1tabf	

1 f	
1 f	
1 f	
6 f	
6f	
2 tab	
1 f	
15 fl	
10 flacoane	
20 f	
10 f	
10 f	
10 fiole	
10 f	

5 buc	
10 f	
10 fiole	
10 fl	
9 fl.	
8 f	
10 pastile	
5 f	
10 f	
3 f	
10 f	
5 f	
5 f	
3 caps	
4 fl	
10 fl	
1 fl	
6 fl	
3 fl	
10 f	
10 f	
5 sup	
1	
60 buc	
40 buc	
10 buc	
20 perechi	
1 buc	
170ml	

1 f	
1 f	
16 fl	
6f	
10 fl	
15 fl	
15 f	
10 f	
10 f	
10 f	
5 buc	
10 f	
10 fiole	
10 f	
10 pastile	
10 fl	
5 f	
10 f	
5 f	

5 f	
5 f	
5 f	
3 caps	
4 fl	
6 fl	
5 fl	
10 f	
5 sup	
1	
60 buc	
40 buc	
10 buc	
20 perechi	
1 buc	
170ml	
100 ml	
140gr	
1 buc	
5 buc	
1 buc	
3 fl	
6 buc	
10 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoa ne	Durata tratamentu lui recomanda t (zile)
1 f	
1 f	
1 f	
6 f	
6f	
18 fl	
15 fl	

10 pst	
15 f	
10 f	
10 f	
10 f	
15 fl	
5 buc	
10 f	
10 amp	
10 fl	
9 fl.	
6 fl	
10 pastile	
5 f	
10 f	
3 f	
5 f	
5 f	
5 f	
3 caps	
4 fl	
10 fl	
10 pastile	
6 fl	
3 fl	
10 f	
1 f	
1	

60 buc	
40 buc	
10 buc	
20 perechi	
1 buc	
170ml	
100 ml	
140gr	
1 buc	
5 buc	
1 buc	
3 fl	
6 buc	
10 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacioane	Durata tratamentului recomandat (zile)

1 f	
6 f	
6f	
20 fl	
2 caps	
10 f	
10 fiole	
5 f	
50 tab	
10 f	
5 fiole	
3 buc	
10 buc	
20 buc	
50 buc	
10 buc	

10 perechi	
1 buc	
170 ml	
140 gr	
1 buc	
1 buc	
1 buc	
3 fl	
3 fl	
1 buc	
10	
Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoane	Durata tratamentului recomandat (zile)

1 f	
1 f	
2 tab	
1 f	
6 f	
6f	
10 tab	
15 fl	
5 f	
2 caps	
8 fl	
10 f	
10 fl	
10 f	
20 f	
5 fiole	

5 fiole	
15 f	
10 f	
20 caps	
5 f	
10 f	
20 f	
5 buc	
20 buc	
25 buc	
10 buc	
10 buc	
10 perechi	
1 buc	
170 ml	
140 gr	
1 buc	
10 f	
3 fl	
10 buc	
15 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoane	Durata tratamentului recomandat (zile)
1 f	
1 f	
6 f	
6f	

10 buc	
2 caps	
10 fl	
6 f	
10 fl	
5 f	
2 fiole	
5 flacoane	
10 f	
10 f	
10 f	
5 fiole	
5 buc	
20 buc	
55 buc	
10 buc	
10 perechi	
1 buc	
170 ml	
140 gr	
1 buc	
1 buc	
3 fl	
10 buc	

15 buc	
Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoa ne	Durata tratamentu lui recomanda t (zile)
1 tab	
1 tab	
1tab.	
1 f	
1 f	
2f	
1 f	
6 f	
6f	

1 f	
15 f	
10fl	
15 f	
10 f	
5 f	
2 caps	
8 fl	
10 f	
10	
10	
6 fiole	
5 fiole	
10 fiole	
5 sup	
5 fiole	
10 buc	
1 buc	
20 perechi	
170 ml	
140 gr	
1 buc	

3 buc	
1 buc	
3 fl	
6 buc	
10	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoa ne	Durata tratamentu lui recomanda t (zile)
1 f	
1 f	

1 f	
6 f	
6f	
1 f	
15 f	
10 fiole	
20 caps	
5 f	
2 caps	
8 fl	
10 f	
10 f	
10 f	
10 fiole	
10 f	
10 f	
5 fiole	
2 fl	
5 f	

15 f	
10 pastile	
5 pastile	
5 buc	
20 buc	
20 buc	
20 buc	
10 buc	
10 perechi	
1 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
10 f	
3 fl	
10 buc	
15 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoa ne	Durata tratamentu lui recomanda t (zile)

1 f	
1 f	
1 f	
6 f	
1 f	
1 f	
1 f	
6 f	
1 f	
6f	
15 f	
1 f	
20 f	
20 f	
15 f	
3 caps	
10 f	

5 f	
15 f	
15 f	
5 fl	
10 f	
10 f	
30 f	
10 f	
10 f	
25 f	
5 f	
5 f	
2 caps	
10 fl	
3 fl	
10 f	
1	
15 fl	
10 ml	
10 f	
3fl	

5 f	
1 f	
1f	
1 f	
1f	
2 f	
2f	
5 f	
10 f	
6f	
1 f	
10 f	
15 f	
30 fl	
10 f	
2 caps	

10 f	
10 f	
10 f	
5 f	
5 f	
10 fl	
15 f	
10 f	
10 caps	
10 f	
14 compr	
10 caps	
10 buc	
20 buc	
30 buc	
40 buc	
10 buc	
25 perechi	
1 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
1 buc	
1 buc	
10 f	
1 fl	
100	
10 buc	
15 buc	

Numarul de prize/tabule/fiole/flacoane	Durata tratamentului recomandat (zile)
5 caps	
15 tab	
2 f	
2f	
1f	
3f	
2 f	
2f	
2 f	
1 f	
4 f	
1f	

1f	
2 caps	
8 fl	
15 f	
10 f	
10 f	
10 f	
15 f	
20 caps	
2 sup.	
5 compr.	
1 fl	
1 fl	
20 f	
5 buc	
20 buc	
25 buc	
20 buc	
10 buc	
10 perechi	

1 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
1 buc	
1 buc	
10 f	
1 fl	
1 fl	
10 buc	
15 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacioane	Durata tratamentului recomandat (zile)
1 f	
1 f	
6 f	
1 f	
1 f	
1 f	

6 f	
1 f	
6f	
1 f	
20 f	
28 f	15
10 f	
10 f	
30 f	
5 f	
5 fl	
20 f	
20	
30	
10	
5	
10	
3 caps	
10	
1 fl	
10 fiole	

20 f	
10 f	
20 f	
5 fiole	
14 caps	
6 fl	
16 buc	
40 buc	
50 buc	
30 buc	
25 buc	
25 perechi	
1 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
1 buc	
1 buc	
5 buc	
10 f	
1 fl	
1 fl	
10 buc	
15 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoa ne	Durata tratamentu lui recomanda t (zile)
2p	
1p	
1 f	
6 f	
1 f	
1 f	
1 f	
6 f	
1 f	
6f	
1 f	
20 f	

28 f	15
10f	
10f	
10f	
10 f	
10 f	
30 f	
20f	
5 fl	
20 f	
20	
30	
10	
5	
10	
3 caps	
10	
1 fl	
15 f	
20 f	
10 f	

20 f	
10 fiole	
14 caps	
6 fl	
16 buc	
40 buc	
50 buc	
30 buc	
25 buc	
25 perechi	
1 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
1 buc	
1 buc	
10 f	
1 fl	
100 ml	
10 buc	
15 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoane	Durata tratamentului recomandat (zile)
1t	
2 t	
1 f	
2 f	
6f	
1 f	
2 f	

3 caps	
20 fl	
10 fiole	
10 past	
10 f	
10 f	
10 f	
10 fiole	
1 buc	
1 buc	
6 buc	
7 buc	
10 buc	
10 perechi	
1 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
1 buc	
1 buc	
10 f	
3 fl	
1 fl	
10 buc	
15 buc	

Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoa ne	Durata tratamentu lui recomanda t (zile)
1 f	
1 f	
15 f	

10 fiole	
20 caps	
5 f	
2 caps	
8 fl	
20 f	
10 fiole	
20 f	
10 f	
5 fiole	
2 fl	
5 f	
15 f	
10 pastile	
5 sup	
5 buc	
20 buc	
20 buc	
20 buc	
10 buc	
10 perechi	
1 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
1 buc	

1 f	
6f	
1 f	
10:00 PM	
20 caps	
10f	
8 f	
10 f	
20 f	
15 fl	
14 caps	
4 fl	
3 buc	
10 buc	
20 buc	
50 buc	
10 buc	
10 perechi	
1 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
1 buc	
1 buc	
10 f	

15 f	
15 f	
15 f	
28 f	
20 caps	
5 caps	
25 fl	
3 fl	
5 f	
10 f	
5 f	
10 f	
5 fl	
3 fl	
2 fl	
10 buc	
30 buc	
45 buc	
30 buc	
20 buc	
25 perechi	
2 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	

1 f	
6 f	
5 f	
10 f	
6f	
5 f	
1 f	
10 f	
15 fiole	
15 f	
6 fl	
15 f	
15 f	
30f	
10 f	
20 caps	
3 comp	
25 fl	
10 sup	
5 f	

5 ml	
10 past	
5 f	
10 f	
5 f	
20 f	
5 fl	
5 f	
3 fl	
2 fl	
10 buc	
30 buc	
45 buc	
30 buc	
20 buc	
25 perechi	
2 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
1 buc	
5 buc	
2 buc	
10 f	
3 fl	
1 fl	
10 buc	

15 buc	
10	
10	
10	
Numarul de prize/tabtile/fiole/flacoane	Durata tratamentului recomandat (zile)
5 f	
2 f	
1 f	

5 f	
10 f	
6f	
5 f	
1 f	
10 f	
15 fiole	
10 f	
10 f	
15 f	
3 fl	
5 f	
6 fl	
15 f	
15 f	
30f	
10 f	
20 caps	
3 caps	
25 fl	
10 sup	
5 f	

5 ml	
10 past	
10 f	
10 f	
5 f	
20 f	
5 fl	
10 past	
3 fl	
2 fl	
10 buc	
30 buc	
45 buc	
30 buc	
20 buc	
25 perechi	
2 buc	
170ml	
140gr	
1 buc	
1 buc	
2 buc	
10 f	
3 fl	
1 fl	
10 buc	
15 buc	
10	
10	
10	
